【委員会報告】

救急外来部門における感染対策チェックリスト

佐々木 淳一^{1, a}, 椎野 泰和², 加藤 康幸³, 工藤 大介⁴, 藤田 昌久⁵, 宮入 烈⁶, 望月 徹⁷, 奥田 拓史⁸, 長門 直⁹, 鍋谷 佳子¹⁰, 高橋 毅¹¹, 救急外来部門における感染対策検討委員会 ¹² および合同ワーキンググループ ^{13,14,15,16}

Checklist for infection control in the emergency department

Junichi Sasaki¹, Yasukazu Shiino², Yasuyuki Kato³, Daisuke Kudo⁴, Masahisa Fujita⁵,
Isao Miyairi⁶, Touru Mochizuki⁷, Hiroshi Okuda⁸, Tadashi Nagato⁹, Yoshiko Nabetani¹⁰, Takeshi Takahashi¹¹,
and on behalf of Committee for Infection Control in the Emergency Department ¹² and the Joint Working Group ^{13,14,15,16}

1 慶應義塾大学医学部救急医学

Department of Emergency and Critical Care Medicine, Keio University School of Medicine

2 川崎医科大学救急医学

Department of Acute Medicine, Kawasaki Medical School

3 国際医療福祉大学医学部感染症学

Department of Infectious Diseases, International University of Health and Welfare School of Medicine

4 東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学分野

Division of Emergency and Critical Care Medicine, Tohoku University Graduate School of Medicine

5 日本医科大学付属病院医療安全管理部感染制御室

Infection Control Team, Nippon Medical School Hospital

6 国立成育医療研究センター生体防御系内科部感染症科

Division of Infectious Diseases, National Center for Child Health and Development

7日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部/救命救急科(救命救急センター)

Infection Control Team, Nippon Medical School Musashi Kosugi Hospital

8 東北大学大学院医学系研究科総合医療学分野

Division of Comprehensive Medicine, Tohoku University Graduate School of Medicine

9 公立学校共済組合中国中央病院内科

Department of Internal Medicine, Chugoku Central Hospital

10大阪大学医学部附属病院看護部

Division of Nursing, Osaka University Hospital

11国立病院機構熊本医療センター

National Hospital Organization Kumamoto Medical Center

12一般社団法人 日本救急医学会

Japanese Association for Acute Medicine

13一般社団法人 日本環境感染学会

Japanese Society for Infection Prevention and Control

14一般社団法人 日本感染症学会

Japanese Association for Infectious Diseases

15一般社団法人 日本臨床救急医学会

Japanese Society for Emergency Medicine

16一般社団法人 日本臨床微生物学会

Japanese Society for Clinical Microbiology

a 〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35

原稿受理日:2019年12月25日 (JJAAM-2019-0108)

要旨 救急外来部門では、新興感染症も含め、様々なヒト・ヒト感染症と遭遇する危険性があり、その感染対策は十分かつ適切に行われるべきである。しかし、救急外来部門での感染対策について十分なエビデンスに基づいて作成されたガイドラインなどはこれまで世界的にも作成されておらず、各施設で独自の対応策を検討・実施している。日本救急医学会は「救急外来部門における感染対策検討委員会」を設置し、日本感染症学会、日本環境感染学会、日本臨床救急医学会、日本臨床微生物学会とともに5学会連携の救急外来部門における感染対策について検討する合同ワーキンググループを組織した。この合同ワーキンググループにおいて、救急外来における感染対策およびそれに関連する事項について総合的かつ多面的に検討を行い、「救急外来部門における感染対策チェックリスト」を公開するに至った。本チェックリストは、救急専従医が少数あるいは配置されていない小規模な救急外来部門であっても、このチェックリストに従い準備をすれば大きな間違いをせずに感染対策が行えることを目的に作成された。この中には、感染対策の管理体制、教育・検診・予防接種体制、感染が疑われる患者への対応、ハード面の感染リスク管理などが含まれており、さらにチェックすべき時期やその間隔については、それぞれカテゴリーとして明示している。本チェックリストが、救急外来部門における感染対策の充実に資することを期待したい。

(日救急医会誌. 2020; 31: 73-111)

キーワード:救急室、感染防止、職業感染、ワクチン接種、環境改善

The risk of encountering a variety of human-to-human infections, including emerging infectious diseases, should be adequately and appropriately addressed in the emergency department. However, no guidelines have been developed anywhere in the world based on sufficient evidence on infection control in the emergency department. Each facility examines and implements its own countermeasures. The Japanese Association for Acute Medicine has established the "Committee for Infection Control in the Emergency Department" in cooperation with the Japanese Association for Infectious Diseases, the Japanese Society for Infection Prevention and Control, the Japanese Society for Emergency Medicine, and the Japanese Society for Clinical Microbiology. A joint working group has been established to consider appropriate measures. This group conducted a comprehensive and multifaceted review of infection control measures for emergency outpatients and related matters, and released a Checklist for Infection Control in Emergency Departments. This checklist has been prepared so that even small emergency departments with few or no emergency doctors can control infection by following the checklist, without committing any major mistakes. The checklist includes a control system for infection control, education, screening, and vaccination, promptly responding to suspected infections, and managing the risk of infection in facilities. In addition, the timing of the check and the interval at which the check is performed are specified as categories. We hope that this checklist will contribute to improving infection control in the emergency department.

(JJAAM. 2020; 31: 73-111)

141041-

Keywords: emergency room (ER), infection prevention, occupational infection, vaccinations, environmental improvement Received on December 25, 2019 (JJAAM-2019-0108)

チェックリスト発行日 2019年12月20日

付 記

- ・救急外来部門における感染対策検討委員会全メンバーの 氏名・所属・利益相反一覧表は巻末に示した。
- ・本チェックリストには、倫理委員会による審査の必要性 および個人情報保護法に関連する内容は含まれていない。

目 次

W	ンめ)に ····································	12
日	本救急医学会の取り組み ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1	12
本	チェックリストの概要1	13
1.	管理体制1	13
	(1) 組織1	13

	(2) 教育・検診・予防接種体制
	① 感染制御に関する管理・教育 115
	② 結核検診116
	③ ワクチン接種116
2.	感染が疑われる患者への対応
	(1) 院内118
	① 早期認知, 初期対応118
	② 感染予防の具体策124
	③ 環境整備127
	(2) 院外129
	④ 救急搬送129
	⑤ 病院間搬送135
3.	モニタリング136
	(1) 機器, 環境など136
4.	構造, ハードウェアの感染リスクの管理137

(1) トイレ137
(2) 待合室137
(3) 診察区域139
(4) 新規に採用される医療機器・医療材料140
5. 多剤耐性菌の監視および対応140
6. 新興・再興感染症対策
7. 行政との連携141
項目一覧144
略語一覧146
M 0 D 75
図の目次
図1 麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘ワクチン接
種のフローチャート117
図 2 感染症問診票例119
図 3 掲示文例120
図 4 感染スクリーニング例122
図 5 感染スクリーニング体制の強化122
表の目次
表1 曝露後の対処127
表 2 SPAULDING の分類129
表 3 職業感染対策131
表 4 滅菌, 消毒, 洗浄の定義と対象資器材132
表 5 感染症法上の分類と消毒方法133
救急外来部門における感染対策検討委員会 および合同ワーキンググループ 委員一覧 148
救急外来部門における感染対策検討委員会 全メンバーの氏名・所属・利益相反一覧表149

はじめに

救急外来部門では、新興感染症も含め、様々なヒト-ヒト感染症と遭遇する危険性があり、その感染対策は十分かつ適切に行われるべきである。しかし、救急外来診療には迅速性が求められる一方で、患者や家族からの情報収集の難しさや複雑さなどから診断が進まない場合も多く、感染対策発動の遅れという危険性が高い。その解決策は、救急外来部門の医療従事者(傷病者を搬送してくる救急隊員も含め)の職業感染対策を充実させることといえる。しかし、救急外来部門での感染対策

日本救急医学会の取り組み

2015 年 1 月,日本救急医学会「救急外来部門に おける感染対策検討委員会」が設置され、日本感 染症学会, 日本環境感染学会, 日本臨床救急医学 会,日本臨床微生物学会とともに5学会連携の救急 外来部門における感染対策について検討する「合同 ワーキンググループ(以下,合同 WG)」が組織さ れた。この合同 WG では、専門的学術団体の立場 で、救急外来における感染対策およびそれに関連 する事項について総合的かつ多面的に検討が行わ れた。その第一段階として、アンケート形式による 3 つの現状調査, 日本救急医学会専門医認定施設を 対象にした救急外来部門における感染対策につい ての調査1)、全国消防機関を対象にした病院前救護 活動での感染対策についての調査2), 日本臨床微生 物学会認定臨床微生物検査技師登録者施設を対象 にした救急外来部門における微生物検査体制につ いての調査3)を行った。次に第二段階として、こ れらの調査結果に基づく救急外来の特殊性を考慮 に入れた感染対策を学会として社会に発信してい くことになり、この度「救急外来部門における感 染対策チェックリストーを公開するに至った。

本チェックリストの概要

「救急外来部門における感染対策チェックリスト」は、救急部門の専従医が少数あるいは配置されていないような小規模な救急外来部門であっても、本チェックリストに従い準備を行うことにより大きな間違いをせずに感染対策が行えることを目的に作成された。この中には、感染対策の管理体制、教育・検診・予防接種体制、感染が疑われる患者への対応、ハード面の感染リスク管理などが含まれており、さらにチェックすべき時期やその間隔については全ての項目が一様ではないことを前提にして、それぞれカテゴリーとして明示した。

<カテゴリー>

- 年 1 回:ハード面の確認や管理体制のチェック が中心
- ・ 四半期(常時):いわゆる手順などのソフト面の確認が中心
- 特定:新規採用者や物品の導入,感染症の流行 状況を考慮した情報のアップデートを目的とし た項目
- 臨時:パンデミック,新興感染症に対する対応 が中心

また、結核に関連した項目については、日本結核・非結核性抗酸菌症学会(日本結核病学会より改称)藤田明理事長に協力を頂いた。

本チェックリストは、日本救急医学会雑誌に掲載された後、5 学会合同ワーキングの構成学会である日本環境感染学会・日本感染症学会・日本臨床救急医学会・日本臨床微生物学会の各機関誌にも掲載される。

著者の佐々木淳一は、アステラス製薬株式会社、MSD 株式会社、大日本住友製薬株式会社、ファイザー株式会社より講演料、ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社より研究費、アステラス製薬株式会社、ファイザー株式会社より奨学寄付金を受けた。合同ワーキンググループ委員の志馬伸朗は、MSD 株式会社、株式会社大塚製薬工場、第一三共

株式会社、大日本住友製薬株式会社、ファイザー株式会社より講演料、旭化成ファーマ株式会社、塩野養製薬株式会社、ファイザー株式会社より奨学寄付金を受けた。柳原克紀は、アステラス製薬株式会社、MSD 株式会社、大正富山医薬品株式会社、第一三共株式会社、日本ベクトン・ディッキンソン株式会社、ファイザー株式会社、ビオメリュー・ジャパン株式会社より講演料、杏林製薬株式会社、塩野義製薬株式会社、日本ベクトン・ディッキンソン株式会社より研究費、MSD 株式会社、第一三共株式会社、大日本住友製薬株式会社、富山化学工業株式会社、ファイザー株式会社、Meiji Seika ファルマ株式会社より奨学寄付金を受けた。

その他の著者,合同ワーキンググループ委員に 利益相反はない。

1. 管理体制

(1) 組織

項目 1. 院内の感染対策委員会に救急外来の責任者 が含まれている。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

救急外来は疾患,重症度の多様な患者が受診し, 入院が必要な患者の病院における玄関ともなっている。緊急時のデバイス挿入など侵襲的手技や感染症 患者の受診もまれではない。また,災害時や感染症 流行時には救急外来が受診者の窓口になることを想 定している場合も多い。このため,救急外来は医療 関連感染が生じやすい部門と考えられるが,限られ た情報を基に診療が行われるため,感染リスクの評 価は十分に行えないことも多いと考えられる。実際 に 2015 年の韓国における中東呼吸器症候群 (MERS) の流行では,3次医療機関の救急外来が感染伝播の 主要な場となった4)。

救急外来の医療従事者における感染対策の実践に

加えて、病院全体が救急外来における感染対策の重要性を認識し、取り組むことが重要である。医療関連感染について情報を収集し、対策を決定する感染対策委員会に救急外来の責任者(医師に限らず救急外来に専従し実質の管理を行っているもの)が参加することを考慮する50。救急外来の特殊性について他部門関係者の関心を高め、救急外来の感染対策の改善を図ることが期待できる。

項目 2. 新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時などに設置される対策本部に、救急外来の責任者が含まれている。

<カテゴリー>

臨時

<解説>

救急外来は新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時には受診者の窓口になることが想定される。実際に、2003 年の重症急性呼吸器症候群(SARS)、2009 年の新型インフルエンザ、2015 年の韓国における中東呼吸器症候群(MERS)の流行では、救急外来に患者が多数受診し、医療関連感染の発生も報告されている4)。救急外来から病棟に入院する患者も生じるため、救急外来の感染対策は病院全体の課題でもある。また、地震などの災害時には避難所でインフルエンザやウイルス性胃腸炎が流行し、患者が救急外来を受診することなども予想される。このような災害時にも感染対策が必要となることがあり、救急外来が重要な役割を持つことを認識する必要がある。

このような観点から、新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時などに設置される対策本部に救急外来の責任者(医師に限らず救急外来に専従し 実質の管理を行っているもの)が参加することが望ましい⁶。

項目 3. 感染制御の専門家に必要時 24 時間相談できる体制を整えている。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

感染対策には、針刺し後の曝露後発症予防など緊 急を要する処置を行う場合が含まれる。また,新型 インフルエンザなど新興・再興感染症が流行した際 に救急外来の受診者が急増して, 待合エリアを拡充 する必要に迫られることなども想定される。24時 間診療を行っていることが多い救急外来では、この ようなことが夜間や休日に発生する場合も想定して おく必要がある。これらの事例が発生した際には, 緊急で感染リスクを評価するなどの専門的な判断や 専門家による手順の認証が必要となることが多い。 経験と知識を有する院内の感染制御の専門家(院内 の感染対策担当部門にかかわっている方, あるいは 院内の感染対策マニュアルに規定されている方) に、救急外来から必要時いつでも(夜間・休日は携 帯電話などを利用)相談できる体制を構築しておく ことが重要であるり。

項目 4. 救急外来専用の感染対策マニュアルが整備 されている, あるいは感染対策マニュアルに救急外 来に関する事項が含まれ, 定期的に見直し, 改訂が 行われている。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

救急外来は疾患,重症度において多様な患者が受診し,入院が必要な患者の病院における玄関ともなっている。緊急下でのデバイス挿入など侵襲的手技やインフルエンザやウイルス性胃腸炎などの感染症患者の受診もまれではない。災害時や新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時には救急外来が受診者の窓口になることを想定している場合も多い。限られたスペースや時間で診療が行われていることも多く,救急外来は医療関連感染が生じやすい部門と考えられる。このような救急外来の特殊性を考慮した感染対策マニュアルが整備されていることが望ましい"。2015年に実施された日本救急医学会

による専門医所属医療機関の調査では、救急外来に関する感染対策マニュアルを有さない施設が 51 (16.8%) あった¹⁾。救急外来専用の感染対策マニュアルではなく、院内感染マニュアルに救急外来の項目を設けるのでも構わない。定期的に見直し、改訂が行われることが重要である。

(2) 教育・検診・予防接種体制

① 感染制御に関する管理・教育

項目 5. 常勤職員だけでなく, 救急外来に関わる職員全員に対し, 感染制御に関する研修を行っている。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

救急外来の運営に関与する職員には多様な職種 (狭義の医療従事者のほかに受付事務,清掃員,警 備員なども含まれる)が存在するが、常勤、非常勤 やフルタイム、パートタイムといった雇用形態を問 わず、すべての職員に感染リスクがあると想定し て、感染制御に関する研修が行われる必要がある 7)。 緊急時においても感染対策を確実に実施できるよう にすることが目標である。中途採用者がある場合に は入職時に研修を行う必要がある。研修の内容は, 標準予防策「血液体液曝露を防ぐ個人防護具 (PPE) 使用法を含む],末梢静脈ラインの確保8, 調剤・薬剤投与における感染制御などを職種に応じ て含めることが望ましい。受付から待合室までの動 線の確認, 呼吸器症状(咳, インフルエンザ様症 状, 気道分泌物増加など) のある患者への咳エチ ケットの励行などは受付事務職員にも重要な内容で ある。また、新型インフルエンザなど新興・再興感 染症流行時には、国による症例定義、疑い患者のト リアージ手順, 個人防護具 (PPE) の使用法などに ついて, 臨時の研修を開催することが望ましい。

項目 6. N95 マスクの正しい着脱のトレーニングと, 定期的なフィットテストが実施されている。 <カテゴリー>

年1回

<解説>

フィットテスト(定量式が望ましい)は、自分に合う N95 マスクのサイズ・形状、フィットする状態、漏れのある状態を数値で確認することが可能となり、職業曝露防止のための知識と技量を体得するための方法の一つである。米国疾病予防管理センターのガイドライン⁹によると、フィットテストは、①医療従事者の安全のため、②正しい着脱方法のトレーニングのため、③自身に合う N95 マスクを確認するため、とされている。

N95 マスクのフィットテストの実施規定は日本ではないが、入職時や曝露リスクの高い部署に配属になった時には実施する必要がある。米国労働安全衛生局¹⁰⁾では、N95 マスクの導入時、その後は 1 回/年、それ以外でも体重の増減や顔貌の変化があったときや着用者からの要望時に行うことが義務づけられている。

項目 7. 新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時には、症例定義、感染制御法などに関する情報が速やかに周知される。

<カテゴリー>

臨時

<解説>

特定の感染症が流行した場合,速やかな情報共有,対策が救急外来においては特に重要である。「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」¹¹⁾(感染症法)の「第七章,新型インフルエンザ等感染症」(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)において,「第四十四条の二厚生労働大臣は,新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは,速やかに,その旨及び発生した地域を公表するとともに,当該感染症について,第十六条の規定による情報の公表を行うほか,病原体であるウイルスの血清亜型及び検査方法,症状,診断及び治療並び

に感染の防止の方法,この法律の規定により実施する措置,その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞,放送,インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない」とされている。対応の詳細ついては,内閣官房所管法令「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に記載されている。 http://www.cas.go.jp/jp/

influenza/120511houritu.html)

また、感染症法における「指定感染症」やその他高病原性鳥インフルエンザ等に係る「指定感染症」に関連する対応については、有事の際の病院の業務継続計画(BCP)にも影響するため、臨時であっても迅速に公的通知等に対応できるよう、情報収集と共有・周知に関する院内ガバナンスの整備が重要である。

② 結核検診

項目 8. 入職時及び最低年 1 回の結核に係る定期の健康診断が実施されている。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

結核の定期健康診断は感染症法第 53 条に規定されている¹¹⁾。医療機関は医療従事者に定期健康診断を行う事業者に指定されており、毎年度に 1 回健康診断を行うことが義務づけられている。その対象者にも受診の義務がある。健康診断は胸部 X 線検査が中心となる。これに加えて、結核患者に接触した場合には必要に応じて、接触者健診が行われる。健診とは別に、咳嗽が 2 週間以上続く場合は医療従事者においても、胸部 X 線検査などを行い結核の可能性がないかについて確認する。

入職時にツベルクリン検査を行う医療機関が多かったが、小児期の BCG 接種による影響性を受けるため、近年はインターフェロン γ 遊離試験(IGRA)を行うことが推奨されている。日本国内では、結核

病棟など恒常的に結核菌に曝露される環境で勤務する職員には入職後にも定期的な検査が推奨されるが¹²⁾, 救急外来の職員に一律に実施するのは一般的ではない。結核低まん延国である米国のガイドラインでは、結核患者を前年に3人以上診療した施設は中等度のリスクと評価し、医療従事者に年1回のツベルクリン検査、あるいは IGRA を行うことを推奨している¹³⁾。これによって、2年以内の比較的早期の感染を把握し、潜在性結核感染症の治療(予防内服)につなげて職員の発症を防止することを目指している。

なお、救急外来職員に対する入職時の BCG 接種は推奨されない。

③ ワクチン接種

項目 9. インフルエンザワクチンの接種が推奨され、 管理されている。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

インフルエンザは感染前にワクチンで予防することが最も有効な防御手段とされている。インフルエンザワクチンの効果に関して、ワクチン株と流行株とが一致している場合には、65 歳以下の健常成人での発症予防効果は70~90%、施設内で生活している高齢者での発症予防効果は30~40%と下がるが、入院や肺炎を防止する効果は50~60%、死亡の予防効果は80%みられたと報告されている14。

特にインフルエンザ患者と接触するリスクの高い 医療関係者においては、自身への職業感染防止の観点、患者や他の職員への施設内感染防止の観点、およびインフルエンザ罹患における欠勤防止のいずれの観点からも、積極的にワクチン接種を受けることが勧められている¹⁴⁾。医療関係者の中でも救急外来の職員は、よりインフルエンザ患者との接触のリスクが高く、接種不適当者に該当しない救急外来の職員は、全員がワクチン接種を受けることが強く推奨 される。

や医療関係者への感染源となることから、免疫を獲




図1. 麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘ワクチン接種のフローチャート (一般社団法人日本環境感染学会 医療関係者のためのワクチンガイドライン 第2版(第1版:院内感染対策としてのワクチンガイドライン)¹⁴ S7麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘ワクチン接種のフローチャートを許諾を得て転載)

ワクチン接種に関しては、治療と異なり健康状態 にある人に実施するため、有害事象に対して注意を 払う必要があり、問診の充実や接種後の健康状態へ の注意などが必要である。また組織としての取り組 みとして、実施に関する内容(接種者、接種日、 ロット番号など)を管理することも必要である。

項目 10. 麻疹、水痘、風疹、ムンプス、HBV の免疫 (ワクチン接種回数、抗体価)が確認され管理され ている。

<カテゴリー>

特定

<解説>

医療関係者が麻疹,水痘,風疹,ムンプスを発症 すると,本人の重症化の可能性に加え,周囲の患者 得しておくことが望ましいとされている¹⁵⁾。特に救急外来には、急な発熱や発疹などの症状で受診する患者もあり、罹患者と接触するリスクも高く、免疫を獲得しておくことが強く推奨される。これらの4疾患はワクチン接種後に年数経過とともに免疫が減衰することもあり、複数回のワクチン接種(1歳以上で「2回」を原則)が推奨されている。また、ワクチンを接種しても免疫が獲得できない場合チンと接種でもあるため、幼少時のワクチン接種歴、抗体価測定結果、近年のワクチン接種歴である。図1のフィンでである。図1のフィンでである。図1のフィンでである。図1のフィンでである。図1のフィンでである。図1のフィンでである。図1のフィンででである。図1のフィンが、ででである。図1のフィンでである。図1のフィンでである。図1のフィンでである。図1のフィンでである。図1の正常である。図1の正常である。図1の正常である。図1の正常である。図1の正常である。図1の正常な対応に繋がる1点の正常などの正常などの正常である。図1の正常な対応に繋がる1点に対しておくことが記述されている1点に対しているに対している。

医療従事者は、患者の血液・体液に接する可能性 が高く、なかでも救急外来では観血的処置が多く、 血液・体液に曝露するリスクが非常に高い。そのうえ、患者の情報は得られない状態がほとんどであり、血液媒介感染には注意が必要である。B型肝炎ウイルスは血液媒介感染をする病原体としては最も感染力が強く、患者に使用した鋭利器材による針刺しや切創、血液・体液の粘膜への曝露などで感染が成立する。患者の背景や提供される医療から、救急外来の医療従事者はB型肝炎ワクチンを接種し、充分な免疫獲得をしておくべきである。

項目 11. 新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時には、行政機関と連携して臨時の予防接種ができる体制がある。

<カテゴリー>

年1回及び臨時

<解説>

医療施設は、新型インフルエンザ等対策特別措置 法の規定に基づく特定接種(医療分野)の対象とな り得る。特定接種を受けるには、事業者が特定接種 管理システムに登録する必要があり、登録には医療 提供事業であることや業務継続計画(BCP)を作成 していることが要件となる¹⁶⁾。

登録を受けた事業者は、新型インフルエンザ等の 発生時においても、医療の提供を継続的に実施する よう努めなければならない。よって事業者は施設内 のワクチンの接種対象者数を把握し、接種順位など を予め決定しておく必要がある。

救急外来は新型インフルエンザなど新興・再興 感染症の診療を最初に行う可能性が高く,施設の 中でもワクチン接種の優先順位の高い部署であ る。救急外来のスタッフがワクチン接種の対象者 として,優先順位が高く設定されているかを確認 しておくべきである。

2. 感染が疑われる患者への対応

(1) 院内

① 早期認知,初期対応

項目 12. 患者から事前の電話連絡があった場合,あるいは受付において,患者に最初に接触する職員が感染症を認知する為に聴取する質問項目をチェックリスト形式で作成し,適宜アップデートしている。

<カテゴリー>

四半期(常時)

<解説>

患者からの電話連絡、あるいは患者が来院した救急外来の受付で感染症に罹患している可能性のある患者をスクリーニングするためのチェックリストが必要である 9 (図 2)。

新興感染症を行政通知に基づき渡航歴と症状からスクリーニングし隔離エリアに誘導する。さらに、必要に応じて症状や接触歴から空気感染、飛沫感染、接触感染する疾患をスクリーニングして、隔離エリアに誘導する。事務員が短時間で聴取することを想定し、問診項目は紙面を用いたチェックリスト形式で準備する。スクリーニング対象は各施設の事情に合わせて検討する。

新興感染症については、行政の通知に従い該当する国や地域への渡航歴と症状からスクリーニングする。

肺結核のスクリーニングにあたって有用性が確認されている病歴は発熱と体重減少であるが、危機管理の観点からは、その他に 3 週間以上続く咳がある、痰に血が混じる、周囲に結核の方がいるなどの間診項目が想定される 17 。

麻疹¹⁸⁾, 風疹, 水痘については, 体に赤いぶつぶつ(発疹)がある, 発熱の有無について確認し, さらに麻疹や水痘患者との接触歴を確認する。問診上は, はしか(麻疹), 風疹(三日ばしか), 水ぼうそう(水痘), 帯状疱疹, など異なる呼び名があることに注意が必要である。

嘔吐・下痢の激しい患者,ノロウイルス等については,吐物がエアロゾル化し伝播の要因となる¹⁹⁾。 使用するトイレについても,他の患者と異なる場所を利用するように指導する²⁰⁾。 渡航歴について<中国,アラビア半島,アフリカ大陸またはその周辺諸国>

ご本人あるいはご家族の方で、上記の国への渡航が 14 日以内にあり、かつ感冒症状 (発熱, せき, 鼻水) がある方はいますか?□ はい yes □ いいえ no

Within the last 14 days, have you or anyone in your family traveled to any countries in the Arabian Peninsula, Africa or China and have symptoms of cold (fever, cough, runny nose)?

3 週間以上続くせき, 痰 (たん) に血が混じるなどの症状はありますか?
□ はい yes □ いいえ no

Have you had cough lasting more than 3 weeks or have sputum mixed with blood?

3週間前から今日までの間で、ご本人および家族のいずれの方が、 結核・はしか・水ぼうそう・おたふくかぜ・帯状疱疹の感染者と 接触しましたか?

□ はい yes □ いいえ no

Have you or anyone in your family come into contact with a person who has Mumps, Tuberculosis, Measles, Chickenpox, or Herpes zoster (shingles) in the past 3 weeks?

発疹 (ぶつぶつ) を伴うような発熱はありませんか?
□ はい yes □ いいえ no

Do you currently have fever and rash?

図2. 感染症問診票例 上記内容を推奨するものではなく、各施設の状況に応じて作成。

新興感染症の場合には症例定義などを含めて、行 政からの通知があるたびに再作成が必要である。

項目 13. 電話連絡の場合、患者を適切な入口へ誘導できる説明体制があり、感染症が疑われる受診患者を適切な入口へ誘導する見やすい掲示がある。

<カテゴリー>

四半期(常時)及び臨時

<解説>

SARS²¹⁾ や MERS⁴⁾ 感染者の多くは救急外来を含む病院における伝播事例であり,国内外の機関から救急外来における対応の強化が求められている⁹⁾。 その他,通年性の一般的な感染症,インフルエンザやノロウイルスに代表される季節性疾患も他の患者に伝播するリスクがある。

項目 12 に従い感染症を問診でスクリーニングし、

揭示文例

発熱,発疹,咳,嘔吐,下痢のある方は受付スタッフまで 申し出ください

発熱,咳のある方はマスクを着用ください。救急外来入口 のマスク販売機をご利用ください

1 か月以内に○○に滞在され、発熱、咳などがある方は受付スタッフまで申し出ください

図 3. 掲示文例

リスクのある患者がいた場合,他の患者との不用意な接触を避けるために誘導する。事前の電話連絡の場合は専用の入り口への誘導あるいは車の中での待機などが考えられる。なお,重症度が高い場合は,スタッフに感染症状について連絡したうえで,初療室(個室)に誘導するなどの対応を検討する。

掲示は患者・付き添い者・面会者を対象としたもので、平易な文言や図で記載され具体的な行動につながることが重要である(図3)。目的は感染症のある患者を適切な場所に誘導すること、あるいは感染対策の実施につなげることである⁹⁾。

所定の場所に誘導した後に、考慮すべき点として 下記が挙げられる。

患者に手洗いをお願いする。咳嗽・鼻汁など呼吸器症状がある場合は原則サージカルマスクの着用をお願いする。ただし,着用が困難な乳幼児,呼吸障害の強い患者については,患者間の距離を 1m 以上保つことを指示する。サージカルマスクの販売機とともに正しい着用方法の掲示があることが望まし

インフルエンザ流行期はサージカルマスク着用を 促す。

下痢、嘔吐のある患者については、利用するトイ

レを指定し、石鹸と流水による手洗いを案内する²⁰。 新興感染症の場合には症例定義などを含めて、行 政からの通知があるたびに再作成が必要である。

項目 14. 患者の対応にあたる場合は、救急外来の受付職員を含め、救急外来職員はサージカルマスク着用を原則とする。

<カテゴリー> 四半期(常時)及び臨時 <解説>

救急外来の職員は、急性呼吸器感染症に曝露する機会が多く、職種に限らず患者接触時にはサージカルマスクの着用が必須である^{22,23)}。職員間の伝播報告も知られている²⁴⁾。急性感染症の多くは、発症前数日からウイルス等を排泄することが知られており、患者を診療している以外の時も、救急外来では着用を原則とする。

呼吸器感染症の患者を診察した後は、サージカルマスクなど個人防護具(PPE)の表面は汚染されていると考え、交換が原則となる²⁵⁾。正しいサージカルマスクの着脱方法を習得するとともに、前後の手指衛生が必須である。エボラウイルスの伝播においても、個人防護具(PPE)の不適切な使用が伝播要

因となり多くの医療従事者が犠牲になっている²⁶⁾。 湿性体液に曝露される手技を実施する場合は,エアロゾル化が想定され,サージカルマスクに加えてアイシールドが必要となる。

空気感染を疑う場合,一部の新興感染症の対応には,サージカルマスクは不適切である。結核に対しては,N95 マスクの着用が必要であり,麻疹・水痘については免疫が確認されている職員が診療にあたる¹⁴⁾。

新興感染症の場合には症例定義などを含めて、行 政からの通知があるたびに再作成が必要である。

項目 15. 受付事務員を含む救急外来スタッフがトリアージをするための問診票あるいは質問票 (渡航先及び滞在期間,感染症曝露の可能性の有無を含む)を日本語と外国語 (英語のほか,感染症流行地で使用される言語を含むことが望ましい)で用意している。

<カテゴリー>

四半期(常時)及び臨時

<解説>

項目 12 で示した対応を確実に実施する為には、事務員が重症度判断、感染経路の推定に関する質問票が必要である²⁷⁾。

日本語の他に,英語,中国語,韓国語など他言語のものがあることが理想的だが,各施設が独自で用意することは困難で,公表されているものなどで代用する²⁸。

新興感染症の場合には症例定義などを含めて,行 政からの通知があるたびに再作成が必要であり,臨 時・四半期ごとに内容をアップデートする。

項目 16. 感染スクリーニング体制が敷かれている。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

救急外来は,感染症に遭遇するリスクが高い場所 であり,受診した患者を渡航歴や症状に応じてコ ホートするための体制が必要である。12-17 項で示した対応を実施する為のシステムは、複数の部門や職種の協力が必要であり、院内の取り決めとして整備する必要がある²⁹⁾。

実際の手順例を**図4**に示す。スクリーニングは問診票に基づき実施するが、「誰が、どこで」行うかを明確にすることが必要である。

患者来院から受付、診察にいたるまでの業務の流 れのなかに、感染症のスクリーニングを組み込むこ とで円滑な対応が可能となる。まず問診票で発熱や 発疹, 呼吸器症状の有無を確認し、また患者からの 申し出を促すための掲示物を作成する。さらに各職 員の役割を明確にし、取りこぼしのないような 2 重・3 重のセーフティネットを構築する。例えば、 受付職員は呼吸器症状のある患者に対してサージカ ルマスクの着用を依頼し, 所定の待合場所に案内 し、トリアージナースに連絡する。トリアージナー スは、症状や病歴から想定される病原体に対する感 染経路別予防策の詳細を指示する。診療にあたる医 師は、診断に基づき隔離解除の判断を管理者や ICT と相談し実施する。各病院の組織、構造、リソース によって対応は異なり、現場を中心とした調整が必 要である。

項目 17. 新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時には、疑い例を含む症例定義に基づく感染スクリーニング体制が強化される。

<カテゴリー>

臨時

<解説>

通常の感染スクリーニング体制に加えて、特定の感染症が流行した場合には、その感染経路や危険性に応じてその体制を速やかに強化する必要がある²⁹⁾。行政連絡から、体制強化、連絡通知に至る手順を院内の決定事項として明文化してあることが必要である(図5参照)。

特定の感染症が流行した際には、行政からの通知 が院内の事務担当者に送付される。院内の事務担当




図4. 感染スクリーニング例 各病院におけるシステムの確認として,年に1回実施する。




図5. 感染スクリーニング体制の強化 各病院におけるシステムの確認として、年に1回実施する。

者は、これを受け必要部署に連絡をする。連絡先は 通常、院内の感染管理担当者であるが、施設の状況 に応じて救急外来担当者やその他の部門に連絡を行 う。

臨時でスクリーニング体制を強化するにあたり、 あらかじめ責任者を明確にしておく必要がある。通 知を受けた責任者は、救急外来担当者を含む関係者 と協議のうえで、具体的な方策を提示し、実行する 権限を持つことが重要である。必要最低限の対応は 現場の判断で速やかに実施可能でなければならな い。対応する疾患や状況に応じて、必要であれば臨 時院内感染防止対策委員会など、病院幹部を含む会 議で協議のうえ決定事項を院内に周知する。

項目 18. 陰圧、HEPA フィルターなどが備えられている特殊または専用診察室への患者および医療従事者の動線が周知され実施されている。

<カテゴリー>

四半期(常時)及び臨時

<解説>

陰圧、HEPA フィルターなどが備えられている特殊または専用診察室(項目 42 参照)は、空気予防策の適用患者(肺結核、麻疹、水痘/播種性帯状疱疹:すべて疑いを含む)で使用する。患者の排出する飛沫核の遮蔽と拡散防止のために、速やかに当該診察室に隔離をする必要があるり。呼吸器症状を認める場合には、感染経路別予防策に係る患者選別のため、受付等と連携して迅速に対応できるよう対応手順や患者や付き添い者への啓発のための個人防護具(PPE)着用や動線の案内が必要である。感染性のある患者を遅滞なく当該診察室に案内することは、職業曝露および一般待合い区域等における曝露者数を最小限にすることができる。こうした対応のハード面、ソフト面の確認は、平時より確認・周知することが有事の際の予防対応として必要である。

項目 19. 主な症状別(発熱・発疹,消化器症状,呼吸器症状)に基本的な動線,隔離方法,対応がマ

ニュアル化され、感染症が疑われる患者の動線とその他の患者および職員の動線が適切に設定されている。

<カテゴリー>

四半期(常時)

<解説>

患者が伝染性感染症の症状や徴候を呈した時点, または医療施設に到着した時点で適切な感染経路別 予防策を実施すれば,伝播リスクを減少させること ができる⁹⁾。

感染経路別予防策が必要な患者すべてを想定して対応することは困難であるが、検査結果を待つ間に感染経路別予防策を経験的に実施することが推奨される⁹。また、患者移動時と待合時の曝露防止への配慮も必要であるため、来院〜受付〜待合場所の指定または誘導および代替案については、新感染症や指定感染症等の対応を目的とした手順の整備が必要である。

患者動線の確保や空間分離は、患者との接触を避けることを目的として行われ、主に新興感染症を想定した場合の付加的措置であり、多少議論の余地はあるが、混雑するエリアへの立ち入りを制限する目的で行うことは、経路別予防策の一環および基礎疾患を有する者への感染対策(平成21年6月19日厚生労働省医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針改定版)として一定のコンセンサスを得られるものである。

- 1. 患者動線を考える際の留意点(空気感染または その疑い)
 - 1) 専用または指定された入り口からの出入り (事前連絡が望ましい)。
 - 2) 専用の待ち合い室での待機(陰圧空調, HEPA フィルター空気清浄, 安全確保のうえ窓開 放)。
 - 3) 検査、その他移動時の専用通路確保、または 混雑エリアを避ける配慮。
- 2. 患者動線を考える際の留意点 (飛沫感染または

その疑い)

- 1) 専用の待ち合い室の使用,または待合エリアの空間分離。
- 2) 検査、その他移動時は混雑エリアを避ける配慮。
- 3. その他共通
 - 1) 症状スクリーニング
 - 2) 患者, 職員の咳エチケットの励行
 - 3) アナウンス, 掲示等の対応
 - 4) 対応職員への周知

② 感染予防の具体策

項目 20. 標準予防策に必要な個人防護具(PPE)は、 各種サイズを十分量かつ必要なときにすぐ使えるように整っている。

<カテゴリー>

四半期(常時)及び臨時

<解説>

ギニア、リベリア及びシエラレオネにおける2014~2016年のエボラウイルス感染症の流行において、医療従事者は一般市民よりも21~32倍感染リスクが高かったこと、現場の最前線で働く医療従事者の個人防護具(PPE)の不適切使用または不足がその原因の一つであったと報告されている300。この報告は、感染対策に必要な物品が各サイズにおいて十分量あり、すぐ使えることが重要であることを示唆している。本邦の感染防止対策地域連携加算チェック項目に「必要なときにすぐ使えるように個人防護具(PPE)が整っている」という項目が挙げられていることからも、その重要性が理解できる。常日頃より不足がないように確認することも大切であるが、四半期毎に使用量の調査を行い、必要量を検討しておく。

また,不特定多数の患者を診療する救急外来においては,予測できない結核患者との接触も考えられるため,救急外来に N95 マスクを用意しておくことが大切である。

なお、感染予防に関する物品の備蓄についてであるが、平時においては標準予防策並びに経路別予防策に準じた個人防護具(PPE)が不足しない程度あれば良いと考える。パンデミック時は、個人防護具(PPE)備蓄期間の目安を8週間程度と試算している報告もある³¹⁾が、行政の行動計画・ガイドラインに従い備蓄すべきである³²⁾。

項目 21. 外傷,嘔吐など症状に応じて,感染制御に 必要な物品をすぐに使用できるよう準備している。

<カテゴリー>

四半期(常時)

<解説>

項目 20 で述べたように、予防に必要な物品が十分量かつすぐ使えることが感染予防において、重要である。救急外来には、様々な症状の患者が受診するため、即座の対応が難しいこともあり、標準予防策並びに経路別予防策に準じた必要物品のセット化が、感染対策上、有用と考えられる。セット化するに当たっては、使用する物品の一包化の他、棚別に物品をまとめておく・症状や経路別に応じたカートを作っておく等の方法が考えられる。

項目 22. 末梢静脈ラインを確保する場合にも,院内 のマニュアルに沿って清潔操作を行っている。

<カテゴリー>

四半期(常時)

<解説>

末梢静脈カテーテルを原因としたカテーテル関連 血流感染症(CRBSI)は $0\sim2.2\%$ と報告されており $^{33)}$ 、一般に留置期間が短いため CRBSI 発生率は低い とされる。

しかし、救急外来における末梢静脈ライン確保は、CRBSI 発生率が有意に増加するとの報告もあり 8,34)、緊急を要する状況において感染対策が不十分になっている可能性を示唆している。

また,アトピー性皮膚炎や尋常性乾癬などにより 慢性皮膚病変を有するあるいは皮膚保清が不十分な 患者ではブドウ球菌やバチルス属などの皮膚常在菌が増殖しており、末梢カテーテル確保における血流 感染のリスクは高くなる。

患者の高齢化に伴い,皮膚病変や保清不十分な患者も増えており,末梢静脈ライン確保をより一層注意して行う必要がある。

項目 23. 感染が疑われない場合であっても, 気管挿管を行う際には, 標準予防策(手袋, アイガード, サージカルマスク等)が実施されている。

<カテゴリー>

四半期(常時)

<解説>

標準予防策は,「すべての患者の血液,体液,分 泌物,嘔吐物,排泄物,創傷皮膚,粘膜などは,感 染する危険性があるものとして取り扱わなければな らない」という考えに基づいている。これは、原因 微生物別あるいは疾患特異的な感染対策ではなく, 感染症の診断が確定する前からの非特異的な感染対 策を行うことが必要であることを示している。ま た,病原体を伝播し得る体液/分泌物/浸出液を感染 媒体とみなした感染対策を行うことを求めている 35)。病原体の伝播リスクが一貫して高いエアロゾル 発生手技に際しては、手袋、長袖ガウン、眼の保護 具(ゴーグルまたはフェイスシールド) および顔面 マスク(サージカルマスク、処置用マスク、または 微粒子レスピレーター) などの個人防護具 (PPE) を使用する。現在得られているエビデンスでは、気 管挿管を単独で、あるいは他の手技(心肺蘇生また は気管支鏡検査など)と併用で実施した場合、伝播 リスクが一貫して高いことが示唆されている36)。以 上より、感染が疑われない患者であっても、気管挿 管時には気道や口腔内の分泌物や血液に曝露する危 険性があることから、標準予防策の遵守は必要であ る。

項目 24. 入院が決定した患者に対し,尿道カテーテルをルーチンに挿入していない。

<カテゴリー> 四半期(常時)

<解説>

尿路感染症は医療関連感染の約 40%を占めており、約 80%は尿道カテーテル留置が原因であると報告されている ^{37,38)}。尿道カテーテル留置は,留置そのものが尿路感染のリスクとなることより,入院患者に対して不必要な尿道カテーテル挿入を行わないことが,尿路感染ならびに医療関連感染の予防となる ³⁹⁾。救急外来においても,尿道カテーテル挿入となく,適応を検討することなく,適応を検討することがが発において非常に重要である。なお,尿道カテーテルの適応として,急性の尿閉や膀胱排尿障害などが挙げられており,留置は必要な期間に留めることが推奨されている。女性・高齢者・免疫機能障害者のようなリスクが高い患者においては,尿道カテーテル挿入に当たり,より慎重な検討が必要とされている。

項目 25. 尿道カテーテル挿入は無菌操作で行われている。

<カテゴリー>

四半期(常時)

<解説>

項目 24 で述べたように、尿路感染症は医療関連感染の約 40%を占めており、約 80%が尿道カテーテルの留置が原因であると報告されている 37,381。尿路感染をできるだけ予防するために、尿道カテーテル挿入では無菌操作に留意し、尿の逆流と回路からの細菌の侵入を防止する必要がある 400。無菌的手技として、①確実な手指衛生を行い手袋を着用する 41,421,②滅菌手袋・ドレープ・スポンジ・潤滑ゼリー等滅菌器材を使用する、③カテーテル挿入前の尿道口周囲の洗浄に適切な消毒薬あるいは滅菌溶液を使用する、④カテーテルの無菌的挿入後は閉鎖式排尿回路を維持すること 39,421 が具体的に挙げられている。感染管理者は、四半期毎に、尿道カテーテル挿入が無菌操作で行われているかの確認と、無菌操作が行

われていない場合は指導ならびに再確認を行う。

項目 26. 血液体液曝露の危険がある患者の診察や胸腔ドレナージ,腰椎穿刺等施行時にはアイガード,サージカルマスクを使用している。

<カテゴリー> 四半期(常時)

<解説>

項目 23 でも述べたが、標準予防策は、「すべての 患者の血液、体液、分泌物、嘔吐物、排泄物、創傷 皮膚、粘膜などは、感染する危険性があるものとし て取り扱わなければならない」という考えに基づい て行われる 35)。

この考えに基づき、胸腔ドレナージ・腰椎穿刺・血液体液曝露の危険がある患者の診察において、標準予防策を遵守すべきである。また、血液体液に曝露した組織別の統計において、眼が 60.1%と他の組織に比べて多く、防護していない皮膚・粘膜への曝露が 82.1%であったとの報告 43) からも、アイガードの使用についてはとりわけ注意し、徹底する必要がある。

項目 27. 中心静脈カテーテル挿入は適応を慎重に吟味し、実施する場合には CLABSI prevention bundle を遵守している。

<カテゴリー> 四半期(常時)

<解説>

院内における血流感染の多くは血管内留置カテーテルに関連している。カテーテル関連血流感染症(CRBSI)発生率は末梢静脈カテーテルよりも中心静脈カテーテルの方が高く44)、救急外来で挿入された場合、中心ライン関連血流感染症(CLABSI)発生率は 1.93/1,000catheter-days であったと報告されている。CLABSI は院内死亡率を上昇させるリスク因子であり45)、CLABSI 予防に最も有効であるのは、不適切な中心静脈カテーテル挿入を行わないことである。中心静脈カテーテルが必要であると判断した場合

は、CLABSI prevention bundle を実施する 46 。 CLABSI prevention bundle は、CLABSI 予防に有用とされている以下の 5 項目から構成される。①カテーテル挿入前に抗菌石鹸またはアルコール含有製剤による手指消毒を行う、②中心静脈カテーテル挿入は maximal sterile barrier precautions(MSBP)で行う、③中心静脈カテーテル挿入前の皮膚消毒は 0.5%を超える濃度のクロルヘキシジンで行い、消毒薬が乾いてからカテーテルを刺入する、④中心静脈カテーテル穿刺部位として大腿静脈を避ける、⑤不要になったカテーテルは速やかに抜去する。

項目 28. 中心静脈カテーテルを挿入する場合には, 手技を行っている以外の医療従事者により清潔操作 維持を監視し,違反があった場合には手技を中止し ている。

< カテゴリー> 四半期(常時)

<解説>

項目 27 で述べたように、中心静脈カテーテルを挿入する場合、CLABSI prevention bundle を実施する 46)。 救急外来において、時間的制約と煩雑な状況から、清潔操作が困難な場合もあるが、CLABSI prevention bundle を遵守するように努める。そのためには、中心静脈カテーテルの不要な挿入を避け、監視下で行うことが有用と考える。なお、「必須行為の省略があった場合、中心静脈カテーテル挿入中止の権限を看護師に持たせる」という項目を含んだ介入を行い、清潔操作の遵守率の向上かつ CLABSI 発生率の低下を認めたとの報告もあり 47)、清潔操作維持の監視は bundle 遵守率の向上ならびに CLABSI 発生率の低下に繋がると考えられる。

項目 29. 感染につながる曝露が疑われる場合の対処 手順が整備されている。

<カテゴリー> 年1回 <解説>

表 1. 曝露後の対処

血液・体液曝露後の対処

B型肝炎 HBs 抗体(+):処置不要

HBs 抗体(-):HBIG+HB ワクチン

C型肝炎 モニタリング(HCV-RNA, 肝機能)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS) 2週間モニタリング(症状,血球計算)

飛沫・飛沫核曝露後の対処 (接触者に免疫がない・不明の場合) 50,51)

麻疹 72 時間以内:麻疹含有ワクチン

6日以内+妊娠など免疫不全あり:グロブリン

ムンプス3 週間モニタリング風疹3 週間モニタリング

水痘 72 時間以内:水痘ワクチン

7日以内:アシクロビル

髄膜炎菌感染症 シプロフロキサシン

結核接触者検診鳥インフルエンザ (H5N1・H7N9)オセルタミビル

外傷や出血症状のある患者を診療することが多 く、侵襲的な医療行為を行うことも少なくない救急 外来では血液・体液の針刺し・粘膜曝露が発生する リスクは一般に高いと考えられるり。B 型および C 型肝炎ウイルス, ヒト免疫不全ウイルス, 重症熱性 血小板減少症候群(SFTS) ウイルスなどが陽性の血 液・体液の曝露があった場合には、曝露部位を流水 で洗浄するとともに、感染リスクに応じて、曝露後 発症予防処置や検診が行われる必要がある48,49)。ま た、飛沫・飛沫核感染する疾患のうち、麻疹、風 疹, 水痘, ムンプスでは事前の免疫の確認が重要で ある48)。免疫がない,あるいは不明な職員が曝露を 受けた場合は、ワクチンやグロブリン、抗ウイルス 薬の投与を検討する (表 1 参照) 50)。 髄膜炎菌感染 症の患者に接触した場合には、医療従事者が患者に 行った医療行為や着用していた個人防護具(PPE) に応じて、感染リスクを評価し、抗菌薬の適応を検 討する必要がある。いずれも緊急性を要するため、 感染リスクが高い曝露については手順をマニュアル に記載するとともに, 院内の感染制御の専門家に 24 時間体制で相談できるようにしておくことが肝 要である。救急外来で結核患者と接触があった場合

のリスク別対応手順を保健所と相談して決めておく ことが望ましい 12 。

③ 環境整備

項目 30. 使用後診察室の清掃,高頻度接触面や汚染 箇所の環境整備(湿式),アルコール抵抗性の微生 物に対する適切な薬剤と濃度に関する手順が周知徹 底されている。

<カテゴリー>

四半期(常時)及び臨時

<解説>

診察室の清掃および表面消毒は、救急外来部門においても病院全般と同様に重要である。埃や砂など、あるいは目に見えない微生物を物理的に取り除くのが清掃であるⁿ。清掃の際は、界面活性剤や洗剤、水などを用いてブラシやモップなどを使用する。超音波クリーナーなどの器械を使用することがである。清掃により多くの微生物を除去することができる。消毒のみを単独で行っても効果は限定的である。消毒を行う前に清掃を行うことが必須である。消毒は、滅菌に比べて微生物を不活性化する程度は

弱いが、消毒によりほぼすべての微生物を除去する ことができる。しかし、芽胞などは不活性化できな いことに注意する。

救急外来部門における清掃および表面消毒につい て、救急外来部門の特殊性を理解しておく必要があ る。初期診療を行う診察室(あるいは診察スペー ス)は、患者が頻繁に入れ替わる。受診患者が多い 時は、前の患者が移動した後、すぐにその診察室で 新たな患者を診察する必要が生じる。患者の診察を 急ぐあまりに、清掃および表面消毒を省略してはな らない。患者や医療従事者への二次感染を防ぐため にも清掃および表面消毒は必須である。空いた診察 室を迅速に清掃および表面消毒を行うシステムを確 立しておく必要がある。また患者が多剤耐性菌を有 している場合でも、患者が救急外来部門を退室して 他病棟などに入院した後に培養などの結果が判明す ることが多い。その場合に、確実に救急外来部門に 情報が入り、適切な消毒を行うことができる院内の 情報伝達システムを確立しておく必要がある。ま た, 多剤耐性菌排菌患者に備えて, 複数種類の消毒 薬を用意し、使い分けをわかりやすく表示し、説明 書に沿って適切に使用することが必要であるり。例 えば、MRSA、 VRE、 Clostridioides (Clostridium) difficile などを排菌している患者を収容している環 境においては、手が触れる環境表面は、4級アンモ ニウム塩またはアルコールを用いることが推奨され ている52)。またウイルスは環境中で比較的長時間生 存できるので、ウイルス感染症患者の診察後の環境 消毒も重要である53,54)。ウイルス汚染の環境に対し ては、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムを用い る。エンベロープがないウイルスはアルコール抵抗 性を有するので、注意が必要である。アルコール抵 抗性が強いウイルスには、ノロウイルス, A型肝炎ウ イルス, ロタウイルス, ポリオウイルス, コクサッ キーウイルス, エコーウイルスなどがある 55,56)。こ れらのウイルスに対しては、次亜塩素酸ナトリウム を用いる。ただし、次亜塩素酸ナトリウムは、金属 に対する腐食作用、繊維製品に対する漂泊作用があ

る。また木材と接触すると効力が減弱する。このような対象物にはアルコールを用いる。アルコールを用いる場合は、消毒対象物に対して二度拭きをして効果を高める⁵⁷⁾。一般に消毒薬の濃度が高いほど殺菌効果は上がるが、被消毒物に与える影響も考慮する必要がある。消毒薬は下記のように様々な状況で濃度が低下している可能性があるので、使用時を要する。低水準消毒薬(クロルキシジングルコン酸塩など)や、ポビドンヨード、次で低素酸ナトリウムなどは有機物混入により濃度が低下する。低水準消毒薬のなかには消毒綿やモップない。 次亜塩素酸ナトリウムは時間経過とともに濃度が低下する。アルコール製剤は揮発により濃度が低下する。

1年に1回あるいは四半期に1回,上記の事項ができていることを確認する $^{\eta}$ 。また多剤耐性菌などのアウトブレイク時には、臨時に確認する。

項目 31. 再利用可能な機器(超音波,血糖測定などのポイントオブケア物品,内視鏡など)は次の患者に使用される前に適切に洗浄・消毒・滅菌されている。

<カテゴリー> 四半期(常時)

項目 32. 再利用可能な機器を洗浄・消毒・滅菌する 場合には適切に個人防護具(PPE)を使用している。

<カテゴリー>

四半期(常時),臨時

項目 33. 再利用 (洗浄・消毒・滅菌) の手順を Handson で教育している。

<カテゴリー> 年**1**回及び特定

<解説>

救急外来部門にある医療機器・器具が単回使用のものか、あるいは再利用可能なものかを把握してお

分類	用途	例	消毒,滅菌の程度
クリティカル器具	無菌組織や血管内に挿入するもの	手術器具	滅菌
Critical items セミクリティカル器具 Semi-critical items	粘膜あるいは健常ではない皮膚に 接触するもの	上部あるいは 下部消化器内視鏡	高水準消毒
ノンクリティカル器具 Noncritical items	正常な皮膚に接触するもの(粘膜には接触しない)	血圧測定用のカフ,聴診器	低から中水準消毒

く必要がある。血糖測定などのポイントオブケア物品,消化器内視鏡,気管支鏡,切開縫合のための手術器具,針,などたくさんの機器が救急外来部門にある。患者患者間の水平感染を防ぐために,すべての再利用可能な医療機器は説明書に沿って適切に洗浄し,メンテナンスしなければならない⁷⁾。これに関しては下記の Spaulding の分類が参考になる(表2参照)⁵⁸⁾。Spaulding の分類は,水平感染のリスクをもとに,どの程度の滅菌あるいは消毒が必要かについて再利用可能機器を分類したものである。

機器に汚れが残っていると消毒や滅菌の効果が不十分になるため、消毒や滅菌の前には洗浄が必要である $^{\eta}$ 。

血糖測定用などに使う微量採血のための穿刺器具には、以下の 3 種類がある。①器具全体がディスポーザブルの製品であり、単回使用専用であるもの、②穿刺針ならびに周辺部分がディスポーザブルの製品で、針の周辺を含めて交換するために複数人に使用が可能であるもの、③穿刺針は交換するが、穿刺針の周辺がディスポーザブルではないもの。このため前回の採血で汚染された場合には、交換した穿刺針が汚染される可能性があり、②と異なり複数人への使用ができないので注意を要する。消化器内視鏡の洗浄や消毒に関しても、「消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサイエティ実践ガイド、改訂版」が公表されており、参考にするべきである59。

再利用可能な医療機器を清潔に適切に使用できるように,機器の説明書を容易に参考にできるようにしておくべきであるⁿ。再利用可能な機器を洗浄,消毒,滅菌するときには,医療従事者自身への感染や医療従事者を介しての患者への感染を防ぐために

個人防護具(PPE)を使用する。個人防護具(PPE)は標準予防策の範疇でよい。各再利用可能な機器の洗浄、消毒、滅菌の適切な方法とその際に適切な個人防護具(PPE)を使用することを1年に1回および新しい機器を導入した場合や方法を変更する場合などにハンズオントレーニングを行う⁷⁾。機器の洗浄、消毒、滅菌を主に行う者に限定せず、部門全体に周知して教育することが重要である。

(2) 院外

④ 救急搬送

項目 34. 病院前救護活動を行う職員からの情報に基づき、病院前救護活動を行う職員に対し適切な感染防止対策を指示している、あるいはすることができる。

<カテゴリー> 特定及び臨時

<解説>

感染が疑われる全ての傷病者と接する時は,標準 予防策が基本である⁹。さらに,何か感染対策に関 連した事象が発生した場合,収容する予定の医療機 関,所轄保健所・衛生局等との情報伝達と共有が重 要である。概念的には,市中で季節性に蔓延してい る感染性疾患と,海外から侵入してくる可能性のあ る感染性疾患と大きく 2 通りある。

前者は、小児では夏から秋にかけてインフルエンザ流行に先行する RS ウイルス感染⁶⁰⁾、秋から冬にかけて感染性胃腸炎 (特にノロウイルス)、冬から春にかけてインフルエンザ等が該当する。感染性胃腸炎とインフルエンザに関しては、標準予防策に感

染経路別予防策を講じつつ⁹, 搬送先にその情報を 確実に伝達する(カテゴリー:特定)。

後者は、関心度が低くなりつつあるが中東で集団 感染が未だに絶えない中東呼吸器症候群 ⁶¹⁾ を始 め、日本では稀もしくは経験のない新興・再興感染 症への備えは、海外渡航・居住歴のある傷病者と接 する場合に生じる。公的な情報は厚生労働省検疫所 (FORTH) ホームページで開示されている。病歴聴 取時に、傷病者が侵淫地域に渡航・居住している情 報を得た場合、標準予防策にどの感染経路別予防策 を講じるかの判断も含め、搬送予定の医療機関もし くは所轄保健所・衛生局に連絡を入れ、搬送先、搬 送時の感染対策等の指示を受けるようにする。その 他に、西日本を中心に発生している重症熱性血小板 減少症候群(SFTS)のような地域性のあるダニ関連 感染が病歴と身体所見で疑われる場合、事前に搬送 予定の医療機関に情報を伝達する⁶²⁾。

項目 35. 当該感染症について,病院前救護活動を行う職員に対して行う感染防止対策の指示内容が用意されている。

<カテゴリー>

特定

<解説>

当該感染症は何かを想定することから対応は始まる。当該感染症に対する適切な感染防止の効果的な手段は,感染経路を遮断することであるり。これを感染経路別予防策と言う。しかし,感染経路別予防策は傷病者の感染症が判明している場合に適応する対策である。病院前救護活動を行う職員は,対応する傷病者が感染症かどうからない状況で接触せざるを得ない。よって,現実的には標準予防策から対策を始める。標準予防策は,対応する傷病者の汗を除く唾液・鼻汁・喀痰・尿・便・腹水・して取りら対策を始める。標準予防策は,対応する傷病者の汗を除ての湿性体液には感染性があるものとして取り扱う基本的な感染対策であり,感染経路別予防策はそれに追加して対応するり。標準予防策を適応しつ、下痢・嘔吐,発疹,発熱,咳,排膿等は経験的

な経路別予防策が必要である。具体的には、呼吸器疾患が予想される場合は飛沫と空気感染予防策を追加し、消化器疾患では接触・飛沫感染予防策を追加して傷病者を扱う。その際、病院前救護活動を行う職員に対する適切な感染対策の指示内容としては、季節性に、冬季ではインフルエンザ、秋から冬季ではノロウイルス主体とした感染性胃腸炎を想定した具体的な予防策のプロトコールを四半期ごとに用意する。「救急隊の感染防止対策マニュアル(Ver. 1.0)」 63) を参照。

項目 36. 病院前救護活動を行う職員が、結核、麻疹、 水痘などが確定もしくは強く疑われる情報を得た場合は、病院前救護活動を行う職員に対し適切な感染 防止対策を指示している。

<カテゴリー>

四半期(常時)

<解説>

病院前救護活動を行う職員が、結核、麻疹、水痘 などが確定もしくは強く疑われる情報を得た場合, 空気感染予防策を講じる。結核侵淫地域での出動で は傷病者接触前の情報収集が必須で、① 2週間以上 の長引く咳を訴える,②1年以内に結核菌塗抹陽 性患者と接触した,③他疾患の治療中に,咳,発熱 が出現し、治りにくい、④抗菌薬治療されているが 反応の悪い不明熱等 64) が該当する場合, 「結核傷 病者の搬送」65)に従った対応をして搬送時感染対策 とする。具体的には、①傷病者にはサージカルマス クを着用してもらう(酸素投与時のフェイスマスク でもよい),②換気扇を回す,または窓を開けて救 急車内の換気をよくする,③病院前救護活動を行う 職員は N95 マスクを着用する (同乗する関係者に も着用してもらう), ④資器材については適切な方 法で洗浄と消毒を実施する,⑤汚染した傷病者への 対応環境, 救急車内での大型機器表面などは, 血液 等目に見える大きな汚染物が付着している場合は, これを清拭除去したうえで, 適切な消毒薬を用いて 清拭消毒する, とある。麻疹, 水痘に関しては, 疑

表 3. 職業感染対策

①針刺し防止策

- 1) 安全装置付きの静脈留置針を使用する。
- 2) 専用容器は静脈路確保後、手の届く場所に置く。
- 3) 静脈留置針は、穿刺した病院前救護活動を行う職員が責任を持って専用容器に捨てる。
- 4) 留置針を手渡ししたり、一時的にストレッチャーの上や床等に置かない。
- 5) リキャップはしない。
- 6) ゴーグルやフェイスシールドで眼を,サージカルマスクで口・鼻への曝露を防止する。

②発生時の処置

- 1) 流水で洗い流す。口で吸ってはいけない。
- 2) 石鹸と大量の流水でしっかり洗う。
- 3) 血液・体液が口に入ったら、うがいをする。
- 4) 血液・体液が眼に入ったら、流水で眼洗する。
- 5) 血液・体液が創傷部に触れたら、流水で洗い流す。

③発生後の対応

- 1) 傷病者の B・C 型肝炎, HIV 感染症情報を収集する。
- 2) 曝露した病院前救護活動を行う職員の B·C型肝炎、HIV 感染症、肝機能等を検査する。
- 3) 1,2 に基づき、病院前救護活動を行う職員への抗 B型肝炎ヒト免疫グロブリン接種等の緊急処置の必要性と、定期的な観察で良いか、およびその後の検査スケジュールを決める。

われる傷病者と接触する病院前救護活動を行う職員は、免疫を有する抗体陽性者あるいはワクチン 2 回接種している者を優先的にするべきである。感染対策としては、麻疹、水痘は感染傷病者の鼻汁、唾液などの湿性体液に含まれており、飛沫を吸い込んで感染する場合が多いため、最低限対応する救急隊はサージカルマスクの着用が重要である。結核と異なり、麻疹、水痘に免疫を有している者が対応するのが基本と考える。病院前救護活動を行う職員は医療機関を受診し、麻疹、水痘、風疹、ムンプス、B型肝炎等の抗体価を調べ、必要に応じてワクチン接種することが望ましい。

項目 37. 診断に基づき、病院前救護活動を行う職員 に対し職業感染対策、表面消毒、環境回復について 助言を行っている。

<カテゴリー>

臨時

<解説>

救急救命士による薬剤投与や心停止前の輸液等の 処置範囲の拡大に伴い,病院前救護活動を行う職員 に対する職業感染対策,表面消毒,環境回復は重要 課題である65)。職業感染対策とは針刺し、および損 傷皮膚・粘膜(特に目)への血液・体液曝露時の対 策である。対策は、①防止策、②発生時の処置、③ 発生後の対応に分かれる(表3参照)。この対応に は医療機関との連携が必要となる。新興感染症につ いての機器・器具・環境の表面消毒・滅菌、環境回 復に関しては, 「感染症の予防及び感染症の患者に 対する医療に関する法律」通称「感染症法」11)に基 づいて対応するのが現実的である。一般原則とし て、感染症の病原体で汚染された機器・器具・環境 の表面消毒・滅菌は、適切かつ迅速に行い、汚染拡 散を防止する。①病院前救護活動を行う職員の手 袋,帽子,感染防止衣,傷病者に直接使用する救急 資器材は、可能なかぎり使い捨て製品を使用する。 ②使用後は,専用の感染性廃棄物用容器に密閉する か、あるいはプラスチック袋に二重に密閉したうえ で、外袋表面を清拭消毒して傷病者と接触している 現場より持ち出し、焼却処理する。③汚染した再利 用器具は、Spaulding の分類(項目 31 表 2 参照)に 準拠し, 用手洗浄後, 器具の使用目的に適した消毒

分類	定義	救急資器材
滅菌	通常、無菌の組織や血管に挿入されるもの	静脈留置針 気管チューブ
消毒	損傷のない粘膜や創のある皮膚に接触するもの	声門上気道デバイス コンビチューブ ラリンゲアルチューブ ラリンゲアルマスク など 喉頭鏡ブレード マギル鉗子 経口エアウエイ 経鼻エアウエイ 吸引カテーテル など
洗浄	損傷のない皮膚に接触するもの	聴診器 血圧計のカフ 酸素マスク 体温計 バッグバルブマスク 頸椎カラー 副子 ターポリン担架 バッグボードなど

(安田康晴:救急現場活動シリーズ 2. 感染防止対策と個人防護. へるす出版, 東京, 2014, p23 を改編)

薬による浸漬消毒を行う(表4参照)。④そのうえ で、滅菌などの必要な処理を行った後、再使用に供 する。洗浄後消毒薬浸漬を行う。リネンは浸漬消毒 しないので、部分的な汚染(血液)に限定される。 ⑤汚染した傷病者への対応環境, 救急車内での大型 機器表面などは、血液等目に見える大きな汚染物が 付着している場合は、これを清拭除去したうえで、 適切な消毒薬を用いて清拭消毒する。清拭消毒前 に, 汚染微生物量を極力減少させておくことが清拭 消毒の効果を高めることになる。消毒薬処理は、滅 菌処理と異なり,対象とする微生物の範囲が限られ ている。抗菌スペクトルからはみ出る微生物が必ず 存在し、条件が揃えば消毒薬溶液中で生存増殖する 微生物もある。よって、対象微生物を考慮した適切 な消毒薬の選択が必要となる。消毒薬の選択は収容 する医療機関の感染防止マニュアルを参考にすると 良い。

項目 38. 診断に基づき、病院前救護活動を行う職員 に対し職業感染対策、表面消毒、環境回復について の助言内容が用意されている。 <カテゴリー> 特定

<解説>

病院前救護活動を行う職員に対する職業感染対策 は、病院前救護活動を行う職員の手袋、帽子、感染 防止衣等の個人防護具 (PPE) 類, 傷病者に直接使 用する救急資器材をできる限り使い捨てにできるよ うに事前準備する。専用の感染性廃棄物用容器は満 杯になっていないか事前確認し、満杯の場合は内容 破棄し表面消毒を徹底する。消毒用アルコール等消 毒薬は使用期限の確認と補充をし、血液や体液汚染 したリネン類はないか確認する。表面消毒,環境回 復対策の準備は「感染症法」に指定された感染が疑 われる傷病者と接触・対応し、搬送する場合、分類 ごとに定められた方法を補足する⁶⁵⁾ (**表 5** 参照)。 グルタラールは,本来ホルムアルデヒドガス曝露防 止の点で浸漬での消毒は使用しないが、病院前で は、消毒を徹底するために密閉空間でないところで の実施を検討する。一般原則として、感染症の病原 体で汚染された機器・器具・環境の表面消毒・滅菌 は、適切かつ迅速に行い、汚染拡散を防止するが、

		 消毒のポイント	
一類感染症	スポラ出血熱、クリミア・コンゴ 出血熱、マールブルグ病、ラッサ 熱、南米出血熱	厳重な消毒が必要である傷	80°C の熱水に 10 分間, 抗ウイルス 用の強い消毒薬, 0.05~0.5%次亜塩 酸ナトリウムで清拭, または 30 分 浸漬。消毒用メタノールで清拭。2 ^c 3.5%グルタラールに 30 分間浸漬。
	ペスト	肺ペストは飛沫感染であるが,傷病者に用いた機器や 傷病者環境の消毒を行う。	80°C の熱水に 10 分間, 両面活性剤 30 分間浸漬。界面活性剤で清拭。0.0 ~0.1% 次亜塩素酸ナトリウムで 拭, または 30~60 分浸漬。アルコ・ ルで清拭。
	痘瘡	傷病者環境の消毒を行う。	エボラ出血熱と同様。
二類感染症	急性灰白髄炎 (ポリオ), 重症急性 呼吸器症候群 (SARS)	傷病者の糞便で汚染された 可能性のある箇所を消毒す る。傷病者環境の消毒を行 う。	エボラ出血熱と同様。
	中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。), 鳥インフルエンザ (H5N1とH7N9)	考えられており、傷病者に	エボラ出血熱と同様。
	ジフテリア	皮膚ジフテリアなどを除き 飛沫感染であるが, 傷病者 に用いた機器や傷病者環境 を消毒する。	ペストと同様。
	結核	空気感染であるが,傷病者 に用いた機器や傷病者環境 を消毒する。	救急車内は換気。車内床等は通常の 浄・消毒。毛布等は日光消毒し洗浄。
三類感染症	コレラ, 細菌性赤痢, 腸管出血性 大腸菌感染症	傷病者の糞便で汚染された 可能性のある箇所を消毒す る。消毒薬の散布や噴霧は しない。	ペストと同様。
	腸チフス,パラチフス	傷病者の糞便・尿・血液で 汚染された可能性のある箇 所を消毒する。	ペストと同様。
四類感染症	E型肝炎,ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む。),A型肝炎,エキノコックス症,黄熱,オウム病,オムスク出血熱,回陽熱,キャサヌル森林病,Q熱,狂犬病,コクシジオイデス症,サル痘,重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。),解育症候性出血熱,西部ウマ脳炎,写解症候性出血熱,デング熱,でア熱,つつが虫病,デング熱,東部ウマ脳炎,鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く。),ニパウイルス	用いた機器や傷病者環境を 消毒する。環境消毒の必 がある場合に行う。 があるおい は行う。 があるおい は で が あるおい が あるおい が ある が ある が ある が ある が ある が ある が ある が あ	芽胞形成菌以外の消毒法 ①煮沸(98℃以上)15~20 分間 ②2%グルタラール ③0.05~0.5%次亜塩素酸ナトリウム ④76.9~81.4%消毒用エタノール 芽胞形成菌の消毒法 消毒前に、洗浄を十分に行い、付着 ている芽胞の数を減らす。グルタラールに3時間以上の浸漬。

表 5. 感染症法上の分類と消毒方法 (続き) 消毒のポイント 消毒方法 病原体 四類感染症 ハンタウイルス肺症候群, Bウイ ルス病,鼻疽,ブルセラ症,ベネ ズエラウマ脳炎、ヘンドラウイル ス感染症,発しんチフス,ボツリ ヌス症,マラリア,野兎病,ライ ム病、リッサウイルス感染症、リ フトバレー熱, 類鼻疽, レジオネ ラ症,レプトスピラ症,ロッキー 山紅斑熱 五類感染症 アメーバ赤痢, ウイルス性肝炎 標準予防策に準ずる。 ①煮沸(98℃以上)15~20分間 (E型肝炎及びA型肝炎を除く。), 疾患特有の感染経路を認識 ②**2**%グルタラール (全数) カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 して対応する。 ③0.05~0.5%次亜塩素酸ナトリウム 感染症,急性脳炎(ウエストナイ 感染経路別に有効な消毒を ④76.9~81.4%消毒用エタノール ル脳炎, 西部ウマ脳炎, ダニ媒介 行う。 クロイツフェルト・ヤコブ病の消毒 脳炎, 東部ウマ脳炎, 日本脳炎, (1) 空気感染 (滅菌)法 ベネズエラウマ脳炎及びリフトバ 適切な空調,換気 高圧蒸気滅菌 134℃ で 18 分間, また レー熱を除く。), クリプトスポリ (2) 飛沫感染 は, 高圧蒸気滅菌 ジウム症, クロイツフェルト・ヤ 環境清掃の徹底 134℃ で 3 分間を繰り返し 6 回。1~ コブ病, 劇症型溶血性レンサ球菌 (3) 接触感染 5%次亜塩素酸ナトリウムに 2 時間浸 感染症,後天性免疫不全症候群, 資器材やドアノブなど, 漬。 ジアルジア症, 侵襲性インフルエ 傷病者や救急隊員が触れ ンザ菌感染症,侵襲性髄膜炎菌感 た場所の消毒・清掃 染症, 侵襲性肺炎球菌感染症, 水 痘(患者が入院を要すると認めら れるものに限る。), 先天性風しん 症候群,梅毒,播種性クリプト コックス症,破傷風,バンコマイ シン耐性黄色ブドウ球菌感染症, バンコマイシン耐性腸球菌感染 症, 風しん, 麻しん, 薬剤耐性ア シネトバクター感染症

(安田康晴:救急現場活動シリーズ 2. 感染防止対策と個人防護. へるす出版,東京,2014, p42-3より改編)

感染症法は随時改訂されるので適宜情報のアップデートが必要となる⁶⁶⁾。新興感染症については,感染症法に基づく対応となるが,中東呼吸器症候群に関しては中東に旅行もしくは居住してラクダから曝露した可能性のある傷病者は未だ絶えないことと,鳥インフルエンザもアジア圏中心に散発している現状は常にインターネット等で情報を更新し,事前収集しておく^{61,67)}。補足情報として,新興感染症に関しては感染症法が基本であるが,新型インフルエンザ及び全国的かつ急速な蔓延のおそれがある新感染症に対する対策の強化を図り,「新型インフルエンザ等対策特別措置法」,通称「特措法」が 2012 年 4

月 27 日制定,同年 5 月 11 日に公布され,地方自治体主導で運用・体制整備が進められている。全国の医療機関では受入要請として医療需要の増大や職員の欠勤が生じることを想定した「診療継続計画」,通称「BCP」を作成・整備し,行政と連携している現状があるが詳細は別紙に譲る48)。病院前の対応も予想されるので,今後検討を要する要件の一つである。

項目 39. 結核、麻疹、水痘などが確定もしくは強く 疑われる場合は、診断に基づき、病院前救護活動を 行う職員に対し職業感染対策、適切な清掃、表面清

拭・消毒、環境回復などについて助言を行っている。

<カテゴリー>

四半期(常時)

<解説>

結核、麻疹、水痘などが確定もしくは強く疑われ る場合は、診断に基づき、病院前救護活動を行う職 員に対し職業感染対策,適切な清掃,表面清拭・消 毒、環境回復などについては助言を行っている。結 核,麻疹に関しては空気感染対策なので,搬送後, 傷病者に用いた機器や傷病者環境を消毒する程度で 良い。搬送後の指示としては、都市部で結核侵淫地 域では結核対策が重要で、救急搬送後は情報の収集 が必須となる。N95 マスク未着用で濃厚接触した病 院前救護活動を行う職員がいた場合、「接触者検 診」の適応となるので、対応が厳密になってくる。 なお、2000 年 5 月より、新結核菌検査指針では結 核菌の排菌ガフキー号数での表示から 1+~3+の簡 便な記載法に改められた68)。四半期定期的な全隊員 の健康状態のチェックは重要で、2週間以上の長引 く咳をする隊員はいないかの確認作業は必要であ る。さらに、無症候でも結核は潜在的に進行する疾 患なので、年1回は最低限病院前救護活動を行う全 職員の胸部レントゲン撮影での健康チェックが勧め られる⁶³)。

⑤ 病院間搬送

項目 40. 必要に応じ患者の個人情報に配慮した上で、 前医に感染対策について適切な助言を行っている。

<カテゴリー>

臨時

<解説>

必要に応じ、特に新興感染症において、感染力が強い、あるいは病原性の高いものについては個人情報に配慮のうえ、適切な情報提供を前医へ、感染対策について適切な助言を行う。国内であれば、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)のような西日本を中心に発生している地域性のあるダニ関連感染⁶²⁾、海

外から侵入してくる可能性のある感染性疾患では中 東呼吸器症候群 61)、高病原性鳥インフルエンザ (H5N1 と H7N9) を始め、日本では稀もしくは経験 のない新興・再興感染症の最新情報は公的には厚生 労働省検疫所(FORTH)ホームページ等で開示され ている 69)。このような近年海外で問題となっている 新興感染症の国内侵入の脅威を受け、新型インフル エンザ及び全国的かつ急速な蔓延のおそれがある新 感染症に対する対策の強化を図り,「新型インフル エンザ等対策特別措置法 | 通称「特措法 | が 2012 年4月27日制定、同年5月11日に公布され、地方 自治体主導で運用・体制整備が進められている 70)。この特措法が運用されるような新興感染症の国 内侵入時、およびパンデミック対応では、地方自治 体/保健所などの行政の指示のもとで感染対策が講 じられる。感染が疑われる患者への対応において, 病院間搬送での前医への指示及びフィードバックは 個々で対応すべきことは「感染症の予防及び感染症 の患者に対する医療に関する法律 | , 通称「感染症 法」の適応で済むが、特措法が運用される事態では 地方自治体/保健所などの行政の指示のもとで対応 することが予想される。新興感染症や特措法対応は 行政機関で搬送のプロトコール等があるので、それ に完全準拠する必要があるからである。搬送患者の 最終的な感染症診断の情報を行政から適切に入手 し、報告を受けることも2次感染防止の視点から必 要と考える。

項目 41. 前医の情報から,適切な搬送時期,搬送方法について指示を行っている。

<カテゴリー>

臨時

項目 42. 病院から外部へ患者搬送を行う場合には, 受け入れ施設や搬送車両に対して感染制御に関する 情報を適切に提供し指導している。

<カテゴリー> 特定及び臨時

<解説>

感染が疑われる患者への対応,病院間搬送にお いて、転送先への情報提供、対策の指示も概念的 には、①市中で季節性に蔓延している感染性疾患 と、②国内・海外から侵入してくる可能性のある 感染性疾患,特に新興感染症において,感染力が 強い、あるいは病原性の高いものについては個人 情報に配慮のうえ, 前医の情報から適切な搬送時 期、搬送方法について行う。①に関しては、夏か ら秋にかけて RS ウイルス感染, 秋から冬にかけて 感染性胃腸炎 (特にノロウイルス), 冬から春にか けてインフルエンザ等が該当する。②に関して は, 国内であれば, 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) のような西日本を中心に発生している地域 性のあるダニ関連感染 62)、海外から侵入してくる 可能性のある感染性疾患では中東呼吸器症候群 61), 高病原性鳥インフルエンザ(H5N1 と H7N9)を始 め、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」,通 称「特措法」が運用されるような新興感染症の国 内侵入時、およびパンデミック対応では、地方自 治体/保健所などの行政の指示に従う。病院間搬送 で前医への指示及びフィードバックは個々で対応 すべき感染が疑われる患者への通常の対応におい ては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する法律」、通称「感染症法」の適応で済 むが、特措法が運用される事態では地方自治体/保 健所などの行政の指示のもとで対応することにな る。転送の可否及び搬送方法は,基本的には医療 機関同士の話し合いで決まるが、病原微生物が特 定できず,新興感染症,特に海外発生の新型イン フルエンザ等感染症や,新感染症が疑われる場合 は,「都道府県知事は,前条の規定により入院す る新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院 に移送しなければならない。| (感染症法 第四十 七条) 71) に則り、地方自治体/保健所に連絡し、指 示を仰ぐ。自院から患者を送り出す場合に, 受け 入れ病院への情報提供や搬送車両に対する感染制 御に関する情報を提供することは重要である。行

政が指定する車両やアイソレーターを要する場合 があるからである。

3. モニタリング

(1) 機器,環境など

項目 43. 特殊診察室を設置し陰圧室の陰圧 (差圧), フィルター管理を定期的に確認する体制がある。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

救急外来部門には,診断を受ける前の感染症患者 が受診する。空気感染、飛沫感染、接触感染を起こ す可能性のある微生物の感染症が疑われる患者 (例,下痢,発熱を伴う呼吸器症状,発熱を伴う発 疹など)は、個室で診察することが望ましい7,72)。 なかでも空気感染を起こす微生物が医療従事者や患 者に二次感染することを予防するためには、陰圧個 室が必要である 73,74)。空気感染を起こす微生物に は、結核、水痘帯状疱疹ウイルス、麻疹ウイルス、 天然痘ウイルスがある。また、CDC ガイドラインで は、ウイルス性出血熱(エボラ出血熱、マールブル グ病、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱)に関し て, 医療機関内における空気を介する感染の報告は ないものの、慎重を期して(前室のある)陰圧個室 で管理することを推奨している 73)。末期の患者の血 液、吐物、液状の便、気道分泌物などがエアロゾル 化して感染を媒介する可能性があり、このリスクを 最小限に減らすためである75)。救急外来部門に何個 の陰圧個室が必要かを受診する患者や地域の実情を 踏まえて検討する 73)。また、現在救急外来部門に陰 圧個室がない場合は、改築や移転の際に陰圧個室の 設置を検討すべきである。ウイルス性出血熱に関わ らず、空気感染を予防するための陰圧個室には前室 があることが望ましい⁷³⁾。前室がない場合は HEPA (high efficiency particulate air) フィルター付空気清 浄機を陰圧個室内に設置すれば空気中の粒子を減ら

すことができる。ただし、効果は限定的であるため HEPA フィルター付空気清浄機のみでは、陰圧個室 としての代替は難しい。最低限、年に1回は陰圧室 の差圧が適切であるか、フィルターが適切に使用および管理されているかを確認する。差圧などの推奨は、CDC ガイドラインに掲載がある 73)。

4. 構造、ハードウェアの感染リスクの管理

(1) トイレ

項目 44. 救急外来内に複数のトイレがある。

項目 45. 個室(隔離用診療室)内,あるいは近接した場所にトイレがある。

項目 46. トイレに手洗い設備が備えられている。

項目 47. トイレの床は清掃しやすい構造である。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

病院内において、トイレは病原体により汚染しや すいので、その管理は重要である。便器表面だけで はなくその周囲の物品や床,壁なども,頻繁に清 掃,消毒を行い清潔に保つ必要がある9,76)。職員用 と患者用トイレは別のものにすることが望ましい。 特に救急外来部門においては、ノロウイルスなど感 染性胃腸炎の流行期に注意が必要である。腸管由来 微生物による感染が疑われる、もしくは診断を受け た患者は、他者への感染を防ぐために、それ以外の 患者が使うトイレとは別のトイレを使用するように するべきである⁹。これをできるようにするため に、救急外来部門内に患者用トイレは複数設置する ことが望ましい。便器やその周辺が便などにより汚 染した場合は、清掃や消毒が完了するまでは、一時 的にトイレ全体の使用を中止する。トイレ付きの個 室を使用して、一患者のみが使うようにできるのが より望ましい9。個室が使用できない場合は、一患 者に対して一つの移動式トイレを使用して、便器だ

けではなく便が付着する可能性のある周囲の物品や床、壁なども十分に清掃、消毒することが重要である^{9,77,78)}。このとき、感染が流行している微生物に応じて、感受性がある適切な薬品を用いる。トイレの洗面台は自動水栓が望ましい。トイレの床は清掃しやすい構造が望ましい。便器が壁排水式であれば、床の清掃が行いやすい。病院や救急外来部門の新築および改築時には、これらを採用するべきである。

(2) 待合室

項目 48. 感染症の流行期, あるいは必要時には, 待合室, 診察室をコホートしている。

<カテゴリー>

四半期(常時)及び臨時

<解説>

感染経路別予防策が必要な患者の長時間の滞在は、待合室や診察室を介しての他の患者・付き添い家族への伝播リスクとなる。そのため、感染経路別予防策が必要な患者(疑い含む)の来院時は、待合室や診察室を別にし、他の患者・付き添い家族との接触をできるだけ避けるようにする521。

インフルエンザなどの流行期には、有症状者を早期に検出するためのポスター掲示や、受付時に有症状者を確認するようトリアージ体制を整備する。有症状者は待合室を別にすることが望ましいが、不可能な場合は最低 1m の距離をとって座るなどの対応を行う ⁷⁹⁾。また、待合室の椅子は患者間の飛沫の曝露を防止するため、向かい合わせの配置は避ける。待合室の広さなど設備面で困難なこともあるが、救急外来における集団感染をできるだけ防ぐような配慮が必要である。

項目 49. 受付にサージカルマスク, 手指消毒薬, ティシュペーパーが常備されており, 足踏み式のゴミ箱へただちに, 適切に廃棄できるよう運用されている。

<カテゴリー>

四半期(常時)

<解説>

救急外来に来院する患者には感染性疾患を有しているものも多いが、来院時には多くは未検査であり、すべての人に対して標準予防策を適切に実施することが重要である。手指衛生は感染対策の基本であり、必要な時にすぐに実施できるよう環境を整えておく必要がある⁵²⁾。受付は来院患者が必ず立ち寄る場所であり、患者も含め、誰もが必要な時に簡便に手指衛生が実施できるように手指消毒剤を設置しておくことが必要である。

受付には発熱や咳などの呼吸器症状があっても, 微生物の拡散防止のためにサージカルマスクを着用 せずに来院する患者も少なくない。呼吸器症状があ る患者には受付でサージカルマスクをつけてもら う52)。また、待合室にいる間も咳や痰などが発生す る可能性もある。そのような患者に対応するため, 受付にはティッシュペーパーを常備し、使用後はす ぐに廃棄できるようゴミ箱を設置することが必要で ある。ゴミ箱の蓋を手で開けるタイプの場合、汚染 した手で触ることで汚染が拡がる可能性あるので、 足踏み式のごみ箱を設置するり。また、ティッシュ ペーパーを廃棄した後は必ず手指衛生を行わなけれ ばならない。手指が汚染した場合は石鹸と流水によ る手指衛生, 眼に見える汚染がない場合は手指消毒 剤による手指衛生を速やかに行う。石鹸と流水によ る手指衛生を行う場合,手洗い設備に移動する間に 汚染を広げないよう, 共有部分を触らないように注 意することも必要である。

項目 50. 建物外にインターホン, 電話等, 院内の職員が応答できる設備がある。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

新型インフルエンザなど新興・再興感染症の罹患 を疑う患者は、直接診察室に入室すると他の患者や 医療従事者が曝露し、感染の拡大につながるリスクが高くなる。他の患者や医療従事者の曝露をできるだけ低減させるため、通常の診察エリアからできるだけ離れた場所で診察することが必要となる52)。

よって新型インフルエンザ等が海外で発生し、病原性が強い恐れがある場合、新型インフルエンザ等を疑う患者の診療は、受入れ体制を整え対応する必要がある。診療の受け入れには、他の患者と交差しないような導線を確保し、ガウン・手袋・N95 マスク・ゴーグルなど適切な防護用具を用いて対応することが必要である52)。

そのためにもインターホンや電話など、建物外から患者が直接職員と連絡が取れ、来院したことや症状などを伝えることができる設備があることが望ましい。またこのような設備や体制をとっていることを広報することも重要である。

項目 51. 患者待合室に手指衛生を行うことができる 設備がある。

<カテゴリー>

四半期(常時)

<解説>

救急外来には感染性疾患の患者も多く来院し,患者の症状によっては,環境が血液や体液,排泄物などで汚染される可能性もある。感染性疾患の患者や付き添い家族の手指は汚染されている可能性が高い。手指衛生は感染対策の基本であり,医療従事者だけでなく患者にも手指衛生の遵守が望まれる。手指衛生の遵守向上には手指衛生が実施できる環境を整えることが重要である。

受付や待合室に手指消毒剤を設置することは容易 に可能であるが、血液や体液などの有機物で汚染さ れた場合は、石鹸と流水による手指衛生を行うこと が必要であり、手洗いシンクの設備が必要となる。 手洗いシンクをすぐに設けることは困難かもしれな いが、新築や改修など設備の見直しが可能な機会に は、患者待合室に手洗い設備を設けることが推奨さ れる。また、手洗いシンクの管理、清掃も重要であ る。

項目 52. イスは湿式清掃可能な素材である。

<カテゴリー>

特定

<解説>

病院の椅子を介した感染拡大を示す報告はないが、病院の環境清掃の基本は湿式清掃であり、日常的に環境用洗浄剤で湿式清掃が可能な素材を使用すべきである。特に救急外来では、出血や嘔吐など、環境を汚染する状況が発生するリスクが高く、待合室の椅子は清掃しやすい素材を使用すべきである。

また有機物で汚染した場合は、次亜塩素酸ナトリウムやアルコールなどの消毒剤を使用することもあるため、これらの消毒剤にも耐えうる素材のものが望ましい。

項目 53. 待合室の近くにトイレがあり, 動線が明確 にされている。

<カテゴリー>

特定

<解説>

救急外来には感染性疾患で下痢や嘔吐などの症状 を有する患者が来院することも多く、患者が急にトイレに行く状況になる可能性も高い。よって、待合 室や診察室の近くにトイレがあることが望ましい。 また、付き添い家族に家族内感染があった場合、付 き添い家族に急な症状が出現する可能性もあり、そ の意味でも待合室の近くにトイレがあることが望ま しい。

トイレの場所はすぐにわかるように表示し、下痢 や嘔吐などの症状を有する患者には、受付時にトイ レの場所を案内することや診察を待つ場所をトイレ の近くに案内するなど配慮する。

感染性疾患が疑われる患者や家族の急な症状による環境の汚染や,使用後の環境汚染の可能性を考えると,施設の大きさにもよるが,複数のトイレがあり他の患者・付き添い家族と使用するトイレを分け

ることが望ましい。新築・大規模改修の際には検討 が望まれる。

(3) 診察区域

項目 54. 特殊診察室には個人防護具(PPE)などを 備えた前室がある。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

特殊診察室を使用する目的には、空気予防策のため陰圧室として機能する場合、差圧を発生させて室内気流を適切にコントロールする場合と、接触予防策のうえでは物理的に隔離されていることを確認し、感染対策のコンプライアンスを維持し間接接触感染のリスクを低減させるために、標準予防策に付加して行うものである。空気予防策の適用を除き、専用隔離室が使用できない場合には、患者が物理的に隔離されていることを確認するための空間確保[>3 フィート(約 1m)の距離など〕や、濃厚接触を最小限にするためにベッド間にあるプライバシーカーテンを使用することが推奨される9,73,741。

項目 55. 診察室、前室のドアは引き戸になっている。

<カテゴリー>

臨時

<解説>

新規の前室の設置は困難な場合は引き戸にすることも推奨される。引き戸は扉を開く際にドア内外の圧差が保たれ、かつ外から内側への気流が維持されやすいため推奨されている^{80,81)}。過去に結核予防会複十字病院の医師による基礎実験文献を参考にしているが、結核患者収容モデル事業(国庫補助事業)の実施要項⁸²⁾においても、特に陰圧室の出入り口の扉は、空気の循環にできるだけ影響を与えないよう引き戸とすることが求められている。施設改善が可能なタイミングを加味し、対応することが望ましいことから、隔離室として指定する場合や新設時の

確認(臨時)でよい。

項目 56. 行政機関に提出が必要な検体, および採取 時の感染制御法について周知されている。

<カテゴリー>

臨時

<解説>

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第16条の3,第26条の4,第27条,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」第10条,第31条及び「感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について(厚生労働省)」において遵守事項等管理規定が定められている。ハード面の管理や法的な取り交しが主だった内容である。検体採取時に想定される疾患や微生物に応じた感染経路別予防策を行う必要がある。採取環境管理(隔離室または陰圧室等)と個人防護具(PPE)の正しい着脱。採取検体の保管及び採取環境の環境管理(換気や環境消毒清掃)について明文化し周知される必要がある。

(4) 新規に採用される医療機器・医療材料

項目 57. 新規の医療機器, 医療材料が導入される際には, 感染制御の専門家の確認が行われ, 現場に対し適切な助言が行われている。

<カテゴリー>

特定

<解説>

従業者の教育・訓練は標準予防策と感染経路別予防策の理解と実践を担保するために不可欠なものである。また、感染性微生物伝播に係る予防対策の原則と実践についての教育・訓練及び助言は、業務開始時または当該器具・器材を初めて使用する際に行う必要がある。血液・体液曝露防止、手指や環境の汚染を介した間接接触感染防止の目的から、感染制御の専門家を通じて実効的な情報提供と教育・訓練及び助言の機会を持ち、対応する必要がある。9。医

療機器,医療材料の変更や導入に伴う手順の改訂時には,最新の情報に基づいた教育・訓練及び助言が必要である。従業者の職種,使用者,責任者等を対象とし,時期・教育形態(情報伝達,演習,シミュレーション,時間)を考慮したうえで,個々に適した教育・訓練及び助言を行うことは,感染対策の周知及びその学習効果を向上させることができる。定型的及び定期的な教育・研修とは異なるため,当該状況が発生した際に実施することでよい。

5. 多剤耐性菌の監視および対応

項目 58. 多剤耐性菌が検出されている場合には、カルテで通知されるなど院内で情報共有ができる。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

救急外来には入院や高齢者施設入所歴のある患者 が受診することも多い。このような患者では多剤耐 性菌を保有している可能性を想定する必要がある。 入院までに救急外来で長時間待機が必要となる場合 も多く、狭いスペースや多忙な医療従事者の影響を 受け、多剤耐性菌の患者間伝播や環境の汚染が生じ やすい。接触予防策が必要となる多剤耐性菌 (MRSA, VRE, 多剤耐性緑膿菌, 多剤耐性アシネト バクター菌など) が検出されていることが事前にわ かっている患者ではカルテの表紙(電子カルテでは トップページ)などにその情報がわかりやすく表示 され, 救急外来で患者を初めて診療する医療従事 者が速やかに認識できるようにすることが望まし いり。なお、院内の複数の病棟で多剤耐性菌のアウ トブレイクが発生している場合には、救急外来が感 染拡大の場となっているリスクもある。このため, 院内の多剤耐性菌検出状況は救急外来と情報共有さ れることが望ましい83)。

6. 新興・再興感染症対策

項目 59. 新興・再興感染症患者に対する初期対応手順が準備されている。

<カテゴリー>

臨時

<解説>

感染症法によって医師の届出を要する新型インフ ルエンザなど新興・再興感染症が流行する際には, 疑似症患者と確定患者は感染症指定医療機関に入院 勧告されることが想定される。一方、保健所を介し た行政検査(地方衛生研究所における病原体検査) を受ける前には、一般医療機関の救急外来に疑い患 者が受診することも想定しておく必要がある。主に 外国で流行している疾患が想定されるため、流行地 の滞在歴や潜伏期間などを基に厚生労働省から症例 定義が公表されることが多い。この症例定義を基 に, 疑い患者が受診した場合の初期対応手順(待合 室、診察室、動線の確保などを含む)について、ア ルゴリズムなどを利用して、わかりやすくまとめて おくことが望ましい 6,84)。最寄りの保健所など関係 機関の連絡先をまとめておくことも推奨される。ま た、保健所や感染症指定医療機関に相談し、行政検 査や転院(感染症指定医療機関への移送)を行う場 合の手順も想定しておくことが望ましい。

7. 行政との連携

項目 60. 感染症法により指定を受けている感染症の 報告手順,連絡先が周知されている。

<カテゴリー>

年1回

<解説>

感染症法で医師の届出の必要な感染症は新感染症, 1類から5類感染症, 新型および再興型インフルエンザに分類されている(このほかに2年を目安に指定される指定感染症がある)。新感染症, 1類から3類感染症と4類および5類感染症の一部

(麻疹,風疹,髄膜炎菌感染症)は診断後直ちに最寄りの保健所に届出することが求められている。届出の必要な感染症について,わかりやすく整理しておくとともに夜間休日も患者を診療することが多い救急外来では,24時間体制で保健所(都整備しておくことが望ましい。患者を入院させる場合には感染対策などについて相談ができるよう,院内の感染制御の専門家にも必要時に連絡を取れる体制を構築しておくことが推奨されるり。なお、新型インフルエンザ発生時には流行状況に応じて,届出の有無が変わるため,行政からの通知を参照しながら,随時院内で周知を図る必要がある。

文 献

- Kudo D, Sasaki J, Ikeda H, et al: A survey on infection control in emergency departments in Japan. Acute Med Surg. 2018; 5: 374-9.
- 2) 森田正則, 佐々木淳一, 佐藤格夫, 他: 病院前救護活動 における感染対策の現状と課題. 日臨救急医会誌 (JJSEM). 2018; 21: 572-7.
- 3) 志馬伸朗, 柳原克紀, 渡邉学, 他: 救急部門における微生物検査に関する多施設調査. 日臨微生物会誌. 2019; 29: 28-31.
- 4) Cho SY, Kang JM, Ha YE, et al: MERS-CoV outbreak following a single patient exposure in an emergency room in South Korea: an epidemiological outbreak study. Lancet. 2016; 10048: 994-1001.
- Liang SY, Theodoro DL, Schuur JD, et al: Infection prevention in the emergency department. Ann Emerg Med. 2014; 64: 299-313.
- World Health Organization (WHO): Hospital preparedness for epidemics. 2014.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Guide to infection prevention for outpatient settings. 2015.
- 8) Trinh TT, Chan PA, Edwards O, et al: Peripheral venous catheter-related Staphylococcus aureus bacteremia. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011; 32: 579-83.
- Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, et al: 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. Am J Infect Control. 2007; 35: \$65-164.
- 10) Labor USDo: RESPIRATOR FIT TESTING. https://www.osha.gov/video/respiratory_protection/fittesting_transcript.html

- 11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する 法律(平成十年法律第百十四号). 施行日: 平成二十八 年四月一日. https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114
- 12) 阿彦忠之, 猪狩英俊, 久保秀一, 他: 結核院内 (施設内) 感染対策の手引き 平成 26 年版. 平成 25 年度厚生 労働科学研究費補助金インフルエンザ等新興再興感染 症研究事業「結核の革新的な診断・治療及び対策の強化に関する研究」. 2014.
- 13) Jensen PA, Lambert LA, lademarco MF, et al: Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health-care settings, 2005. MMWR Recomm Rep. 2005; 54: 1-141.
- 14) 岡部信彦, 荒川創一, 岩田敏, 他: 一般社団法人日本環境感染学会 医療関係者のためのワクチンガイドライン第2版(第1版: 院内感染対策としてのワクチンガイドライン). 日環境感染会誌. 2014; 29: np1-S13.
- 15) 国公立大学附属病院感染対策協議会: 病院感染対策ガイドライン. 2018.
- 16) 厚生労働省:特定接種(医療分野). Available on line at: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_ir you/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokuteisesshu.html
- 17) Gonçalves Bd, Lambert Passos SR, Borges Dos Santos MA, et al: Systematic review with meta-analyses and critical appraisal of clinical prediction rules for pulmonary tuberculosis in hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol. 2015; 36: 204-13.
- 18) Bloch AB, Orenstein WA, Ewing WM, et al: Measles outbreak in a pediatric practice: airborne transmission in an office setting. Pediatrics. 1985; 75: 676-83.
- 19) Bonifait L, Charlebois R, Vimont A, et al: Detection and quantification of airborne norovirus during outbreaks in healthcare facilities. Clin Infect Dis. 2015; 61: 299-304.
- 20) Verani M, Bigazzi R, Carducci A: Viral contamination of aerosol and surfaces through toilet use in health care and other settings. Am J Infect Control. 2014; 42: 758-62.
- 21) Chen YC, Huang LM, Chan CC, et al: SARS in hospital emergency room. Emerg Infect Dis. 2004; 10: 782-8.
- 22) Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, et al: Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst Rev. 2011; 7: Cd006207.
- 23) Radonovich LJ Jr, Simberkoff MS, Bessesen MT, et al: N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among Health Care Personnel: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019; 322: 824-33.
- 24) Gehanno JF, Pestel-Caron M, Nouvellon M, et al: Nosocomial pertussis in healthcare workers from a pediatric emergency unit in France. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999; 20: 549-52.
- 25) Otter JA, Donskey C, Yezli S, et al: Transmission of SARS and MERS coronaviruses and influenza virus in healthcare

- settings: the possible role of dry surface contamination. J Hosp Infect. 2016; 92: 235-50.
- 26) Fischer WA 2nd, Hynes NA, Perl TM: Protecting health care workers from Ebola: personal protective equipment is critical but is not enough. Ann Intern Med. 2014; 161: 753-4.
- 27) 東京都福祉保健局: 新型インフルエンザの発生に備えて. 2017. Available online at: http://www.fukushihoken. metro.tokyo.jp/iryo/kansen/shingatainflu/keihatsu.files/poly glot-pamphlet.pdf
- 28) 東京都福祉保健局: 医療機関受診のための多言語ガイドブック かけに//www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kansen/tagengoguide.files/tagengogaido2019-mihiraki.pdf
- 29) Srinivasan A, McDonald LC, Jernigan D, et al: Foundations of the severe acute respiratory syndrome preparedness and response plan for healthcare facilities. Infect Control Hosp Epidemiol. 2004; 25: 1020-5.
- 30) World Health Organization (WHO): Global Open consultation for innovative Personal Protective Equipment. 2017.
- 31) Hashikura M, Kizu J: Stockpile of personal protective equipment in hospital settings: preparedness for influenza pandemics. Am J Infect Control. 2009; 37: 703-7.
- 32) World Health Organization (WHO): Hospital preparedness checklist for pandemic influenza: focus on pandemic (H1N1) 2009. 2009.
- 33) Helm RE, Klausner JD, Klemperer JD, et al: Accepted but unacceptable: peripheral IV catheter failure. J Infus Nurs. 2015; 38: 189-203.
- 34) Pujol M, Hornero A, Saballs M, et al: Clinical epidemiology and outcomes of peripheral venous catheter-related bloodstream infections at a university-affiliated hospital. J Hosp Infect. 2007; 67: 22-29.
- 35) Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007. 2007.
- 36) Tran K, Cimon K, Severn M, et al: Aerosol-Generating Procedures and Risk of Transmission of Acute Respiratory Infections: A Systematic Review [Internet]. 2011. Available online at: http://www.cadth.ca/media/pdf/M0023__Aerosol_ Generating_Procedures_e.pdf
- 37) Krieger JN, Kaiser DL, Wenzel RP: Urinary tract etiology of bloodstream infections in hospitalized patients. J Infect Dis. 1983; 148: 57-62.
- 38) Haley RW, Culver DH, White JW, et al: The nationwide nosocomial infection rate. A new need for vital statistics. Am J Epidemiol. 1985; 121: 159-67.
- 39) Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, et al: Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. Infect Control Hosp Epidemiol. 2010; 31: 319-26.
- 40) Turck M, Goffe B, Petersdorf RG: The urethral catheter and urinary tract infection. J Urol. 1962; 88: 834-7.

- 41) Ehrenkranz NJ, Alfonso BC: Failure of bland soap handwash to prevent hand transfer of patient bacteria to urethral catheters. Infect Control Hosp Epidemiol. 1991; 12: 654-62.
- 42) Tenke P, Kovacs B, Bjerklund Johansen TE, et al: European and Asian guidelines on management and prevention of catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents. 2008; 31 Suppl 1: S68-78.
- 43) 職業感染制御研究会: エピネット日本版サーベイ 2011 結果概要報告「エピネット日本版B皮膚粘膜曝露」.2011.
- 44) Theodoro D, Olsen MA, Warren DK, et al: Emergency Department Central Line-associated Bloodstream Infections (CLABSI) Incidence in the Era of Prevention Practices. Acad Emerg Med. 2015; 22: 1048-55.
- 45) Siempos II, Kopterides P, Tsangaris I, et al: Impact of catheterrelated bloodstream infections on the mortality of critically ill patients: a meta-analysis. Crit Care Med. 2009; 37: 2283-9.
- 46) O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al: Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Am J Infect Control. 2011; 39: S1-34.
- 47) Berenholtz SM, Pronovost PJ, Lipsett PA, et al: Eliminating catheter-related bloodstream infections in the intensive care unit. Crit Care Med. 2004; 32: 2014-20.
- 48) 木村哲: 医療現場における職業感染予防と曝露後の対処. 医薬ジャーナル社, 大阪, 2015, p96-100.
- 49) 国立国際医療研究センター 国際感染症対策室: 重症熱 性血小板減少症候群診療の手引き. 2016.
- Heymann DL: Control of Communicable Diseases Manual, 20th Edition. APHA Press, 2014.
- 51) World Health Organization (WHO): Avian influenza A (H7N9) virus: post-exposure antiviral chemoprophylaxis of close contacts of a patient with confirmed H7N9 virus infection and/or high risk poultry/environmental exposures. 2014.
- 52) 国公立大学附属病院感染対策協議会: 病院感染対策ガイドライン 2018. じほう, 東京, 2018.
- 53) Zachoval R, Frösner G, Deinhardt F, et al: Persistence of hepatitis B virus antigens in dried blood. Lancet. 1981; 8223: 778
- 54) Doultree JC, Druce JD, Birch CJ, et al: Inactivation of feline calicivirus, a Norwalk virus surrogate. J Hosp Infect. 1999; 41: 51-7.
- 55) Mbithi JN, Springthorpe VS, Sattar SA: Chemical disinfection of hepatitis A virus on environmental surfaces. Appl Environ Microbiol. 1990; 56: 3601-4.
- 56) Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Updated norovirus outbreak management and disease prevention guidelines. 2011.
- 57) 一般社団法人 アルコール協会: ノロウイルスに係るエタノール使用ガイドライン. 2015. Available online at: http://www.alcohol.jp/download/noroguideline1.pdf
- 58) 社団法人日本感染症学会, 社団法人日本化学療法学会, 日本環境感染学会, 他: 微量採血用穿刺器具の取り扱い について. 2008.

- 59) 消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践 ガイド作成委員会(日本環境感染学会,日本消化器内視 鏡学会,日本消化器内視鏡技師会):消化器内視鏡の感 染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド [改訂 版].2013.
- 60) IDWR: 〈注目すべき感染症〉RS ウイルス感染症. 2017. Available online at: https://www.niid.go.jp/niid/ja/rs-virus-m/rs-virus-idwrc/7509-idwrc-1734.html
- 61) 厚生労働省検疫所: 中東呼吸器症候群コロナウイルス (MERS-CoV) の発生報告. 2017. Available online at: http://www.forth.go.jp/topics/2017/06141127.html
- 62) 厚生労働省: 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) に関する Q&A. 2017. Available online at: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts qa.html
- 63) 消防庁救急企画室長: 救急隊の感染防止対策の推進について(通知) 救急隊の感染防止対策マニュアル (Ver. 1.0). 消防救 第49号 平成31年3月28日.
- 64) 青木正和: 日常診療・業務に役立つ結核病学 結核症の 診断 発病の診断. 日胸臨. 2000; 59: 944-59.
- 65) 安田康晴: 感染防止対策と個人防護. へるす出版, 東京, 2014, p44.
- 66) 厚生労働省: 感染症法に基づく医師の届出のお願い. Available online at: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kan senshou11/01.html
- 67) 国立感染症研究所感染症疫学センター, 国立国際医療研究センター病院国際感染症センター: 中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザ (H7N9) 患者搬送における感染対策. 2014. Available online at: https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-m/flutoppage/2273-flu2013h7n9/idsc/4859- patient-transport-
- 68) 山中喜代治: 新結核菌検査指針と一般病院での抗酸菌検 査. 結核. 2002; 77: 99.

mersandh7n9.html

- 69) 厚生労働省検疫所: FORTH 海外で健康に過ごすために. Available online at: http://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/index.html
- 70) 厚生労働省健康局結核感染症課: 新型インフルエンザ対策 (特措法を含め). 2014. Available online at: https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/kikikanri/H26/20141015-03.pdf
 - niid.go.jp/niid/images/idsc/kikikanri/H26/20141015-03.pdf #search='新型インフルエンザ等対策特別措置法'
- 71) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する 法律. Available online at: https://elaws.e-gov.go.jp/search/ elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000 000114&openerCode=1#H
- 72) The Australasian College for Emergency Medicine (ACEM): EMERGENCY DEPARTMENT DESIGN GUIDELINES. 2014.
- 73) Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. 2003.

- 74) Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health-care facilities. 2005.
- 75) Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Notice to Readers Update: management of patients with suspected viral hemorrhagic fever--United States. 1995.
- 76) Martinez JA, Ruthazer R, Hansjosten K, et al: Role of environmental contamination as a risk factor for acquisition of vancomycin-resistant enterococci in patients treated in a medical intensive care unit. Arch Intern Med. 2003; 163: 1905-12
- 77) Donskey CJ: The role of the intestinal tract as a reservoir and source for transmission of nosocomial pathogens. Clin Infect Dis. 2004; 39: 219-26.
- 78) Dassut B: The implementation of a commode cleaning and identification system. Nurs Times. 2004; 100: 47.
- 79) Dick EC, Jennings LC, Mink KA, et al: Aerosol transmission of rhinovirus colds. J Infect Dis. 1987; 156: 442-8.
- 80) Tang JW, Nicolle A, Pantelic J, et al: Different types of door-opening motions as contributing factors to containment failures in hospital isolation rooms. PLoS One. 2013; 8: e66663.
- 81) Kalliomäki P, Saarinen P, Tang JW, et al: Airflow patterns through single hinged and sliding doors in hospital isolation rooms – Effect of ventilation, flow differential and passage. Building and Environment. 2016; 107: 154-68.
- 82) 東京都福祉保健局: 結核患者収容モデル事業実施要領. 2007. Available online at: http://www.fukushihoken.metro. tokyo.jp/iryo/kansen/kekkaku/model.files/model_yoryo.pdf
- 83) 前崎繁文: 救急で問題となる薬剤耐性菌 MRSA から MDRPまで. 日救急医会誌. 2010; 21: 51-62.
- 84) 加藤康幸, 西條政幸, 足立拓也, 他: ウイルス性出血熱 一診療の手引き—2017 改訂新版: 2017.

項目一覧

1. 管理体制

(1) 組織

- 項目 1. 院内の感染対策委員会に救急外来の責任者が含まれている。
- 項目 2. 新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時などに設置される対策本部に、救急外来の責任者が含まれている。
- 項目 3. 感染制御の専門家に必要時 24 時間相談できる体制 を整えている。
- 項目 4. 救急外来専用の感染対策マニュアルが整備されている, あるいは感染対策マニュアルに救急外来に関する事項が含まれ, 定期的に見直し, 改訂が行われている。

(2) 教育・検診・予防接種体制

① 感染制御に関する管理・教育

- 項目 5. 常勤職員だけでなく, 救急外来に関わる職員全員に 対し, 感染制御に関する研修を行っている。
- 項目 6. N95 マスクの正しい着脱のトレーニングと, 定期的 なフィットテストが実施されている。
- 項目 7. 新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時には、症例定義、感染制御法などに関する情報が速やかに周知される。

② 結核検診

項目 8. 入職時及び最低年 1 回の結核に係る定期の健康診断が実施されている。

③ ワクチン接種

- 項目 9. インフルエンザワクチンの接種が推奨され、管理されている。
- 項目 10. 麻疹, 水痘, 風疹, ムンプス, HBV の免疫 (ワクチン接種回数, 抗体価) が確認され管理されている。
- 項目 11. 新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時には、行政機関と連携して臨時の予防接種ができる体制がある。

2. 感染が疑われる患者への対応

(1) 院内

① 早期認知、初期対応

- 項目 12. 患者から事前の電話連絡があった場合, あるいは受付において, 患者に最初に接触する職員が感染症を認知する為に聴取する質問項目をチェックリスト形式で作成し, 適宜アップデートしている。
- 項目 13. 電話連絡の場合,患者を適切な入口へ誘導できる説明体制があり,感染症が疑われる受診患者を適切な入口へ誘導する見やすい掲示がある。
- 項目 14. 患者の対応にあたる場合は、救急外来の受付職員を 含め、救急外来職員はサージカルマスク着用を原則とす ス
- 項目 15. 受付事務員を含む救急外来スタッフがトリアージをするための問診票あるいは質問票(渡航先及び滞在期間,感染症曝露の可能性の有無を含む)を日本語と外国語(英語のほか,感染症流行地で使用される言語を含むことが望ましい)で用意している。
- 項目 16. 感染スクリーニング体制が敷かれている。
- 項目 17. 新型インフルエンザなど新興・再興感染症流行時には、疑い例を含む症例定義に基づく感染スクリーニング体制が強化される。
- 項目 18. 陰圧, HEPA フィルターなどが備えられている特殊 または専用診察室への患者および医療従事者の動線が周知 され実施されている。
- 項目 19. 主な症状別 (発熱・発疹,消化器症状,呼吸器症

状)に基本的な動線,隔離方法,対応がマニュアル化され,感染症が疑われる患者の動線とその他の患者および職員の動線が適切に設定されている。

② 感染予防の具体策

- 項目 20. 標準予防策に必要な個人防護具 (PPE) は,各種サイズを十分量かつ必要なときにすぐ使えるように整っている。
- 項目 21. 外傷, 嘔吐など症状に応じて, 感染制御に必要な物品をすぐに使用できるよう準備している。
- 項目 22. 末梢静脈ラインを確保する場合にも、院内のマニュ アルに沿って清潔操作を行っている。
- 項目 23. 感染が疑われない場合であっても, 気管挿管を行う際には, 標準予防策 (手袋, アイガード, サージカルマスク等) が実施されている。
- 項目 24. 入院が決定した患者に対し、尿道カテーテルをルーチンに挿入していない。
- 項目 25. 尿道カテーテル挿入は無菌操作で行われている。
- 項目 26. 血液体液曝露の危険がある患者の診察や胸腔ドレナージ, 腰椎穿刺等施行時にはアイガード, サージカルマスクを使用している。
- 項目 27. 中心静脈カテーテル挿入は適応を慎重に吟味し、実施する場合には CLABSI prevention bundle を遵守している。
- 項目 28. 中心静脈カテーテルを挿入する場合には,手技を 行っている以外の医療従事者により清潔操作維持を監視 し,違反があった場合には手技を中止している。
- 項目 29. 感染につながる曝露が疑われる場合の対処手順が整備されている。

③ 環境整備

- 項目 30. 使用後診察室の清掃, 高頻度接触面や汚染箇所の環境整備(湿式), アルコール抵抗性の微生物に対する適切な薬剤と濃度に関する手順が周知徹底されている。
- 項目 31. 再利用可能な機器(超音波, 血糖測定などのポイントオブケア物品, 内視鏡など)は次の患者に使用される前に適切に洗浄・消毒・滅菌されている。
- 項目 32. 再利用可能な機器を洗浄・消毒・滅菌する場合には 適切に個人防護具 (PPE) を使用している。
- 項目 33. 再利用 (洗浄・消毒・滅菌) の手順を Hands-on で 教育している。

(2) 院外

④ 救急搬送

- 項目 34. 病院前救護活動を行う職員からの情報に基づき、病院前救護活動を行う職員に対し適切な感染防止対策を指示している、あるいはすることができる。
- 項目 35. 当該感染症について、病院前救護活動を行う職員に対して行う感染防止対策の指示内容が用意されている。
- 項目 36. 病院前救護活動を行う職員が、結核、麻疹、水痘などが確定もしくは強く疑われる情報を得た場合は、病院前

- 救護活動を行う職員に対し適切な感染防止対策を指示している。
- 項目 37. 診断に基づき,病院前救護活動を行う職員に対し職業感染対策,表面消毒,環境回復について助言を行っている
- 項目 38. 診断に基づき,病院前救護活動を行う職員に対し職業感染対策,表面消毒,環境回復についての助言内容が用意されている。
- 項目 39. 結核、麻疹、水痘などが確定もしくは強く疑われる場合は、診断に基づき、病院前救護活動を行う職員に対し職業感染対策、適切な清掃、表面清拭・消毒、環境回復などについて助言を行っている。

⑤ 病院間搬送

- 項目 40. 必要に応じ患者の個人情報に配慮した上で,前医に 感染対策について適切な助言を行っている。
- 項目 41. 前医の情報から,適切な搬送時期,搬送方法について指示を行っている。
- 項目 42. 病院から外部へ患者搬送を行う場合には、受け入れ 施設や搬送車両に対して感染制御に関する情報を適切に提 供し指導している。

3. モニタリング

(1) 機器,環境など

項目 43. 特殊診察室を設置し陰圧室の陰圧 (差圧), フィルター管理を定期的に確認する体制がある。

4. 構造, ハードウェアの感染リスクの管理

(1) トイレ

- 項目 44. 救急外来内に複数のトイレがある。
- 項目 45. 個室(隔離用診療室)内、あるいは近接した場所に トイレがある。
- 項目 46. トイレに手洗い設備が備えられている。
- 項目 47. トイレの床は清掃しやすい構造である。

(2) 待合室

- 項目 48. 感染症の流行期,あるいは必要時には,待合室,診察室をコホートしている。
- 項目 49. 受付にサージカルマスク, 手指消毒薬, ティシュペーパーが常備されており, 足踏み式のゴミ箱へただちに, 適切に廃棄できるよう運用されている。
- 項目 50. 建物外にインターホン,電話等,院内の職員が応答できる設備がある。
- 項目 51. 患者待合室に手指衛生を行うことができる設備がある。
- 項目 52. イスは湿式清掃可能な素材である。
- 項目 53. 待合室の近くにトイレがあり、動線が明確にされている。

(3) 診察区域

項目 54. 特殊診察室には個人防護具 (PPE) などを備えた前室がある。

項目 55. 診察室、前室のドアは引き戸になっている。

項目 **56**. 行政機関に提出が必要な検体,および採取時の感染制御法について周知されている。

(4) 新規に採用される医療機器・医療材料

項目 57. 新規の医療機器, 医療材料が導入される際には, 感染制御の専門家の確認が行われ, 現場に対し適切な助言が

行なわれている。

5. 多剤耐性菌の監視および対応

項目 58. 多剤耐性菌が検出されている場合には、カルテで通知されるなど院内で情報共有ができる。

6. 新興・再興感染症対策

項目 59. 新興・再興感染症患者に対する初期対応手順が準備 されている。

7. 行政との連携

略語一覧

	1	
AIDS	Acquired Immune Deficiency Syndrome	後天性免疫不全症候群
BCG	Bacille de Calmette et Guérin	カルメット・ゲラン桿菌
ВСР	Business Continuity Plan	事業継続計画
CDC	Centers for Disease Control and Prevention	アメリカ疾病管理予防センター
CLABSI	Central Line-Associated Blood Stream Infection	中心ライン関連血流感染
CRBSI	Catheter-Related Blood Stream Infection	カテーテル関連血流感染
FORTH	FOR Traveler's Health	厚生労働省検疫所
НВ	Hepatitis B	B型肝炎
HBIG	Hepatitis B Immune Globulin	B型肝炎免疫グロブリン
HBs	Hepatitis B Virus Surface	B型肝炎ウイルス表面
HBV	Hepatitis B Virus	B型肝炎ウイルス
HCV-RNA	Hepatitis C Virus - Ribonucleic Acid	c型肝炎ウイルス-リボ核酸
НЕРА	High Efficiency Particulate Air	高性能粒子捕捉器
HIV	Human Immunodeficiency Virus	ヒト免疫不全ウイルス
ICT	Infection Control Team	感染対策チーム
IGRA	Interferon-Gamma Release Assays	インターフェロン-γ 遊離試験
MERS	Middle East Respiratory Syndrome	中東呼吸器症候群
MRSA	Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
MSBP	Maximal Sterile Barrier Precautions	マキシマルバリアプリコーション
PPE	Personal Protective Equipment	個人(用)防護具
RSV	Respiratory Syncytial Virus	RS ウイルス
SARS	Severe Acute Respiratory Syndrome	重症急性呼吸器症候群
SFTS	Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome	重症熱性血小板減少症候群
VRE	Vancomycin-Resistant Enterococci	バンコマイシン耐性腸球菌

項目 60. 感染症法により指定を受けている感染症の報告手順,連絡先が周知されている。

救急外来部門における感染対策検討委員会および 合同ワーキンググループ 委員一覧

委員長

佐々木淳一 慶應義塾大学医学部救急医学

作成委員

椎野 泰和 川崎医科大学救急医学

加藤 康幸 国際医療福祉大学医学部感染症学

工藤 大介 東北大学大学院医学系研究科外科病態学講

座救急医学分野

藤田 昌久 日本医科大学付属病院医療安全管理部感染

制御室

宮入 烈 国立成育医療研究センター生体防御系内科

部感染症科

望月 徹 日本医科大学武蔵小杉病院感染制御部/救命

救急科 (救命救急センター)

奥田 拓史 東北大学大学院医学系研究科総合医療学分

野

長門 直 公立学校共済組合中国中央病院内科

鍋谷 佳子 大阪大学医学部附属病院看護部

委員

池田 弘人 帝京大学医学部救急医学

志馬 伸朗 広島大学大学院救急集中治療医学

佐藤 格夫 愛媛大学大学院医学系研究科救急医学

松山 重成 兵庫県災害医療センター高度救命救急セン

横田 裕行 日本医科大学大学院医学研究科救急医学分

野

大毛 宏喜 広島大学病院感染症科

渡邉 学 東邦大学医療センター大橋病院外科

森田 正則 堺市立総合医療センター救命救急センター

添田 博 東京医科大学病院薬剤部

柳原 克紀 長崎大学大学院病態解析・診断学(臨床検

査医学)

協力者(日本結核・非結核性抗酸菌症学会)

藤田 明 東京都保健医療公社多摩南部地域病院

担当理事(日本救急医学会)

高橋 毅 国立病院機構熊本医療センター

代表理事 (日本救急医学会)

嶋津 岳士 大阪大学大学院医学系研究科

救急外来部門における感染対策検討委員会:所属学会・氏名・所属・利益相反・作成の役割一覧表

日本医学会 COI 管理ガイドライン(2017 年 3 月)に定める様式に従い、自己申告による COI を開示する。 経済的 COI 開示方針:作成関係者全員について,投稿時点の前の年から過去 3 年間および出版受理時点までの期間を対象に(2016 年~2018 年),発表内容に関係する企業・組織または団体との COI 状態を著者ごとに自己申告記載する。

項目 ①報酬額 ②株式の利益 ③特許使用料

1つの企業・団体から年間100万円以上 1つの企業から年間100万円以上,あるいは当該株式の5%以上保有

1 つにつき年間 100 万円以上

1つの企業・団体からの年間合計 50 万円以上

研究費・助成金などの総額 1つの企業・団体から,医学系研究(共同研究,受託研究,治験など)に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた 100 万円以上のものを記載 奨学(奨励)寄附金などの総額 1つの企業・団体からの奨学寄附金を共有する所属部局(講座、分野あるいは研究室など)に対して,申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた 100 万円以上のものを記載 実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた 100 万円以上のものを記載 1つの企業・団体から年間 5 万円以上

⑥研究費・助成金などの総額

4)購演料 5原稿料 ①奨学(奨励) 寄附金などの総額 ⑧企業などが提供する寄附講座 ⑨旅費,贈答品などの受領

(Mings) 福田田でごの文家 - 1.00mm は 氏名 所属学会		所属医療機関	(I)	3	(e)	(4)	2	9	(L)	8	6	役割
- 日本救急医学会 慶應義塾大学医学部救急医学	慶應義塾大学医学部救急医学		なしな	۲	なし	アステラス製薬 (株) MSD (株) 大日本住友製薬(株) ファイザー (株)	なしな	ロシュ・ダイアグノス ティックス (株)	アステラス製薬 (株) ファイザー (株)	なし	なし	奏 員 長
椎野 泰和 日本救急医学会 川崎医科大学救急医学	川崎医科大学救急医学		なし な	7	なし	なし	なし	りな	なし	なし	なし	作成委員
加藤 康幸 日本感染症学会 国際医療福祉大学医学部感染症学	国際医療福祉大学医学部感染症学		なし な	_	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	作成委員
工藤 大介 日本救急医学会 東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学分野	東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座教急医学		なしな		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	作成委員
昌久 日本環境感染学会 日本医科大学付属病院医療安全管理部感染制御室	日本医科大学付属病院医療安全管理部感染制御	[HH]	なしな	なしれ	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	作成委員
烈 日本感染症学会 国立成育医療研究センター生体防御系内科部感染症科		_	なし な	_	なし	なし	なし	つな	なし	なし	なし	作成委員
孙	日本医科大学武蔵小杉病院感染制御 (救命救急センター)	效急科	なしな	٦	なし	なし	なし	1な	なし	なし	なし	作成委員
拓史 日本救急医学会 東北大学大学院医学系研究科総合医療学分野	東北大学大学院医学系研究科総合医療学分野		なし な	7	なし	なし	なし	りな	なし	なし	つな	作成委員
日本救急医学会	公立学校共済組合中国中央病院内科		7	7	なし	なし	なし	りな	なし	なし	なし	作成委員
佳子 日本環境感染学会 大阪大学医学部附属病院看護部	大阪大学医学部附属病院看護部		なしな	_	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	作成委員
弘人 日本救急医学会 帝京大学医学部救急医学	帝京大学医学部救急医学		なし な	7	なし	なし	なし	りな	なし	なし	なし	委員
伸朗 日本救急医学会 広島大学大学院救急集中治療医学	広島大学大学院救急集中治療医学		なしな	٦	なし	第一三共 (株) MSD (株) 大日本住友製薬 (株) ファイザー (株) (株) 大塚製薬工場	なし	カなし	塩野義製薬 (株) 旭化成ファーマ (株) ファイザー (株)	なし	なし	极具
格夫 日本救急医学会 愛媛大学大学院医学系研究科救急医学	愛媛大学大学院医学系研究科救急医学		なし な	7	なし	なし	なし	りな	なし	なし	なし	委員
日本救急医学会 兵庫県災害医療センター高度救命救急	センタ		なし な	٦	なし	なし	なし	1なし	なし	なし	なし	委員
日本救急医学会	学研究科救急医		なし な	_	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	委員
日本環境感染学会	広島大学病院感染症科		なし な	7	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	委員
			なし な	L	なし	なし	なし	りなし	なし	なし	なし	委員
	堺市立総合医療センター救命救急センタ		なし な	7	なし	なし	なし	1なし	なし	なし	なし	委員
日本臨床救急医学会 東京医科大学病院薬剤部			なしな	٦	なし	なし	なし	りな	なし	なし	なし	委員
方紀 日本臨床微生物学会 長崎大学大学院病態解析・診断学(臨床検査医学) 	- 長崎大学大学院病態解析・診断学(臨床検査医!	(羔	なしな	٦	なし	第一三共 (株) ファイザー (株) MSD (株) 大正富山医薬品 (株) 日本ペクトン・ ディッキンソン (株) アステラス製薬 (株)	なし(;	日本ペクトン・ ディッキンソン (株) 塩野義製薬 (株) 杏林製薬 (株)	第一三共(株) 大日本住友製薬(株) MSD(株) 富山化学工業(株) ファイザー(株) Meiji Seikaファルマ(株)	なし	なし	极
日本結核・非結核性 抗酸菌症学会 (日本)東京都保健医療公社多摩南部地域病院 結核病学会より改称)	E 東京都保健医療公社多摩南部地域病院		なしな		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	協力者
日本救急医学会	国立病院機構熊本医療センター		_	_	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	垣 票福量
岳士 日本救急医学会 大阪大学大学院医学系研究科	大阪大学大学院医学系研究科		なしな	٦	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	代表理事